

深圳市第十四届职工技术创新运动会暨 2024 年深圳技能大赛——“南粤家政”育婴员职业技能竞赛

初赛理论知识

一、单选题

- 1、如果()与家长及看护人交谈,会达不到交流的效果。……………参考答案: B
- A、围绕婴儿的个性特征、兴趣进行探讨
 - B、选择与家长生活相关和自己感兴趣的话题
 - C、围绕婴儿的自身发展及教育等相关的话题进行交流
 - D、选择与婴儿生活、成长相关的话题进行交流
- 2、只有学习和掌握()生长发育的特点和规律,才能做好育婴工作。……参考答案: D
- A、1~3 岁婴儿
 - B、0~4 岁儿童
 - C、1~6 岁儿童
 - D、0~3 岁婴儿
- 3、育婴员工作质量的优劣、工作水平的高低,直接关系到()婴幼儿的身心健康、家庭幸福。……………参考答案: A
- A、0~3 岁
 - B、0~1 岁
 - C、0~2 岁
 - D、1~2 岁
- 4、指导培训家长和看护人不应采用()等方法。……………参考答案: A
- A、书信或是网上论坛
 - B、设立托幼儿所开放日、组织亲子游戏和相关活动
 - C、举办专题讲座、咨询、家访、个别指导
 - D、组织讨论交流、家长会、面对面的交谈

5、受婴幼儿年龄特点的制约，我国3岁以下婴幼儿（ ）在家中养育。……………**参考答案：D**

- A、60%以上
- B、70%以上
- C、80%以上
- D、90%以上

6、根据《中华人民共和国职业分类大典》的规定，我国职业被归为8个大类，其中育婴员属于（ ）：商业、服务业人员。……………**参考答案：A**

- A、第四大类
- B、第三大类
- C、第二大类
- D、第一大类

7、婴幼儿的教养主体是（ ）。……………**参考答案：B**

- A、医师
- B、婴幼儿家长
- C、育婴员
- D、护士

8、婴儿开始出牙的时间是（ ）。……………**参考答案：C**

- A、2-5个月
- B、3-6个月
- C、4-10个月
- D、10-12个月

9、婴儿尽管是生理性远视，但对近距离看物仍较清楚，是因为他们（ ）。……………**参考答案：D**

- A、眼球前后径长
- B、晶体弹性差
- C、眼睛容易斜视
- D、晶状体弹性好，调节能力强

10、育婴员是通过对0-3岁婴幼儿的（ ）的服务，辅助和指导家长完成科学育儿工作的人员……………**参考答案：A**

- A、生活照料、护理和教育
- B、生活照料

C、护理

D、教育

11、形成社会与个体的简单概念，是婴幼儿（ ）。……………**参考答案：D**

A、游戏的任务

B、养育的任务

C、学习的任务

D、生长发育的任务

12、1岁以后得婴幼儿记忆过程缺乏（ ）。……………**参考答案：B**

A、想象力

B、明确的目的

C、主动性

D、创造性

13、3岁左右的婴幼儿随着（ ）的发展，产生带有简单主题和角色的游戏，能够反映婴幼儿模仿成人社会生活情节的想象活动。……………**参考答案：A**

A、经验和言语

B、动作

C、认知

D、情感

14、良好的职业道德是做好工作的（ ）。……………**参考答案：B**

A、保证

B、基础

C、前提

D、根基

15、学习和掌握社会主义道德和职业道德的基本知识，对（ ）精神文明和物质文明建设有重要作用。……………**参考答案：A**

A、社会主义

B、共产主义

C、理想主义

D、资本主义

16、育婴员的职业道德规范，它涵盖了育婴员和服务对象、育婴行业和育婴员（ ）、育婴员之

间的关系。……………参考答案：D

- A、整体
- B、团体
- C、群体
- D、个体

17、如果没有对()婴幼儿的感情，显然就无法选择并从事育婴员的工作。……………参考答案：B

- A、0~1岁
- B、0~3岁
- C、1~2岁
- D、2~3岁

18、0~3 婴儿心理发展包含()等重要方面。……………参考答案：C

- A、感知觉能力、记忆能力、思维能力、自卫能力、学习能力
- B、注意特性、情绪情感特点、意志特征、世界观、人生观
- C、感知觉能力、记忆能力、注意特性、思维能力、情绪情感特点、自我意识水平
- D、生活能力、人生观、判断能力、思考能力

19、()是婴儿教育的心理基础。……………参考答案：B

- A、人脑的发展
- B、个体发展的关键期
- C、人的感知觉的发展
- D、人的思维的发展

20、婴幼儿的发育尚未完成，他们有时吵闹任性，有时根本不听从指令，却不知举动的危险性，这给育婴员带来很严重的()。……………参考答案：C

- A、生理压力
- B、生活压力
- C、心理压力
- D、工作压力

21、育婴员的日常工作中并非简单地完成任务，而是需要投入()的。……………参考答案：D

- A、财力
- B、物力
- C、人力

D、情感

22、育婴员的工作就是照料（ ）婴幼儿的生活。……………参考答案：B

A、0—1岁

B、0—3岁

C、0—2岁

D、1—2岁

23、育婴员必须（ ）这一岗位对婴幼儿生长和发育具有的重要作用。……………参考答案：C

A、理解

B、了解

C、认识

D、领悟

24、育婴员要认真对待自己的岗位，严格（ ）自己的岗位职责……………参考答案：D

A、施行

B、奉行

C、遵守

D、履行

25、诚信服务是育婴员职业意识的（ ）。……………参考答案：C

A、基本原则

B、基本途径

C、基本要求

D、基本行为

26、育婴员面对（ ）婴幼儿，两者在体能、智能等方面有着巨大的差距。……………参考答案：B

A、0—1岁

B、0—3岁

C、0—2岁

D、1—2岁

27、1-4岁婴幼儿每日钙的需求量是（ ）。……………参考答案：B

A、800mg

B、600mg

C、400mg

D、200mg

28、百白破疫苗不能预防（ ）传染病。……………参考答案：C

- A、白喉
- B、百日咳
- C、白癜风
- D、破伤风

29、婴幼儿消化道的发育从胎儿期开始，以后继续发展至（ ）初具规模。……………参考答案：A

- A、1岁
- B、8个月
- C、6个月
- D、4个月

30、（ ）是营造良好的进餐氛围的主要方法。……………参考答案：A

- A、尊重婴儿对食物的爱好和兴趣
- B、强迫或哄骗婴儿进餐
- C、婴儿如果不吃饭就批评他
- D、对饭菜不用介绍，直接让幼儿吃就可以了

31、婴儿的咽鼓管呈水平位，故咽部炎症容易侵入中耳引起（ ）。……………参考答案：A

- A、中耳炎
- B、药物中毒性耳聋
- C、泪管炎
- D、咽鼓管炎

32、（ ）左右婴幼儿乳牙长齐，共20颗。……………参考答案：C

- A、1岁
- B、1岁半
- C、2岁
- D、2岁半

33、在（ ）婴幼儿语言发展的关键时期，如果在与婴幼儿语言交流时采用不同的方言，可能造成婴幼儿心理的困扰，使婴幼儿开口困难。……………参考答案：B

- A、0—1岁
- B、0—3岁

C、0—2岁

D、1—2岁

34、如果在与婴幼儿语言交流时采用不同的方言，可能造成婴幼儿心理的困扰，使婴幼儿开口困难，语言表达产生（ ）。……………**参考答案：C**

A、通畅

B、便利

C、障碍

D、挫折

35、育婴员要用真诚去传情达意，学习理解不同文化背景下的不同教养理念，使彼此的交流更为顺畅、更为（ ）。……………**参考答案：C**

A、开心

B、快捷

C、高效

D、低能

36、在职业培训过程中，学习技能的同时也需要学习理论，这样才能学会灵活运用，在从业过程中，面对新的问题迁移知识，（ ）。……………**参考答案：C**

A、融会贯通

B、浅尝辄止

C、举一反三

D、不求甚解

37、培训时间是有限的，培训过程是短暂的，为了在有限的的时间里掌握劳动技能以及相关理论知识，育婴员必须牢记（ ）。……………**参考答案：B**

A、锲而舍之

B、勤能补拙

C、得过且过

D、熟能生巧

38、育婴员经过职业培训，通过了职业鉴定，取得职业资格证书，这只是迈出职业生涯的（ ）。……………**参考答案：D**

A、第二步

B、第三步

C、第四步

D、第一步

39、遵纪守法是每一位育婴员必须具备的最起码的（ ）。……………**参考答案：B**

A、职业要求

B、道德要求

C、职业道德

D、职业操守

40、入户服务的育婴员还应该购买（ ），保证自身在工作过程中的安全。……………**参考答案：B**

A、理财保险

B、意外保险

C、安全手册

D、育婴书籍

41、婴幼儿不会总是服从照护人的指令，这就让育婴工作较其他家庭服务工作更加（ ）。……………**参考答案：D**

A、容易

B、单纯

C、简单

D、复杂

42、（ ）是以提高综合能力为重点的素质教育，是尊重婴幼儿的兴趣和自主选择的权利，为人的终身发展奠定良好基础的教育。……………**参考答案：A**

A、婴幼儿的早期教育

B、婴幼儿的道德观

C、婴幼儿的义务

D、婴幼儿的权利

43、家庭是婴幼儿出生后最早接触的教养环境、也是婴幼儿全面发展的（ ）场所。……………

参考答案：C

A、最终

B、娱乐

C、最初

D、公共

44、婴幼儿在游戏时不需要被干扰，()的婴儿躺在床上，把手移到眼前，不停地看，都是独处的游戏。……………**参考答案：C**

A、2~3个月

B、1~2个月

C、3~4个月

D、1~1.5个月

45、婴儿床围上坚固的栏杆，高度需超过()。……………**参考答案：D**

A、40cm

B、50cm

C、60cm

D、70cm

46、为了满足婴幼儿各种动作综合发展的需要，在有条件的情况下，可以建立一个专门的()。……………**参考答案：C**

A、游戏空间

B、生活空间

C、运动空间

D、学习空间

47、把婴儿床围上坚固的栏杆，高度超过()，床的外面不要摆放家具，床内不要摆放过大的硬性玩具，以免婴儿爬上玩具翻过栏杆，坠落地面。……………**参考答案：C**

A、60cm

B、65cm

C、70cm

D、55cm

48、婴儿从出生()就要开始补充维生素D。……………**参考答案：B**

A、1周左右

B、2-3周左右

C、8-10周以后

D、15-20周以后

49、()是属于中枢神经系统。……………**参考答案：A**

A、脑

- B、脑神经
- C、脊神经
- D、内脏神经

50、() 属于上呼吸道。……………参考答案：B

- A、气管
- B、鼻
- C、肺泡
- D、支气管

51、() 是身体各部分重量的总和，是反映营养状况最易获得的指标。……………参考答案：B

- A、身高
- B、体重
- C、身长
- D、头围

52、正常婴儿出生时的平均体重为 ()。……………参考答案：D

- A、1kg
- B、1.5kg
- C、2kg
- D、3kg

53、2岁到青春前期平均每年增加 ()。……………参考答案：A

- A、2kg
- B、5kg
- C、7kg
- D、10kg

54、() 是指头顶到足底的全身长度，是反映骨骼发育的重要指标。……………参考答案：C

- A、臀围
- B、体重
- C、身长
- D、头围

55、正常新生儿出生时平均身长为 ()。……………参考答案：D

- A、20cm

B、30cm

C、40cm

D、50cm

56、1 周岁婴幼儿身长约为 ()。……………**参考答案：B**

A、50cm

B、75cm

C、100cm

D、125cm

57、新生儿头围平均是 ()。……………**参考答案：B**

A、24cm

B、34cm

C、44cm

D、54cm

58、6 个月时头围平均是 ()。……………**参考答案：C**

A、22cm

B、32cm

C、42cm

D、52cm

59、正常婴幼儿胸围比头围小 ()。……………**参考答案：A**

A、1-2cm

B、3-4cm

C、5-6cm

D、7-8cm

60、5 岁以下臂围超过 () 为营养好。……………**参考答案：D**

A、10.5cm

B、11.5cm

C、12.5cm

D、13.5cm

61、() 是指婴幼儿颅骨结合不紧所形成的颅骨间隙。……………**参考答案：B**

A、闭合

B、 囱门

C、 顶骨

D、 额骨

62、 () 由额骨和顶骨骨缝构成。……………**参考答案： C**

A、 枕骨

B、 颅骨

C、 前囱门

D、 后囱门

63、 新生儿头长约占身长的 ()。……………**参考答案： C**

A、 1/2

B、 1/3

C、 1/4

D、 1/5

64、 成人头长约占身长的 ()。……………**参考答案： B**

A、 1/7

B、 1/8

C、 1/9

D、 1/10

65、 人一生中免疫功能最差、呼吸系统性疾病最多发生期是 ()。……………**参考答案： D**

A、 1 个月到 2 个月

B、 3 个月到 4 个月

C、 5 个月到 6 个月

D、 7 个月后至 12 岁前

66、 婴幼儿视觉能力的发展, () 颜色视觉开始发展。……………**参考答案： B**

A、 1 个月

B、 4 个月

C、 2 个月

D、 3 个月

67、 婴幼儿味觉能力的发展, () 对类似糖水、柠檬水等的味道能精确分辨。…**参考答案： D**

A、 1 至 2 个月

B、2至3个月

C、5至6个月

D、3至4个月

68、() 进入十二指肠发挥多种消化酶的消化作用。……………参考答案：A

A、胰液

B、胰岛素

C、唾液

D、肾上腺素

69、婴儿的膳食搭配不正确的是()。……………参考答案：D

A、荤素搭配

B、干稀搭配

C、动物性食物与植物性食物搭配

D、凉热搭配

70、百日咳病程一般需要()左右才能痊愈，需要耐心护理和治疗。……………参考答案：C

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、4个月

71、秋季腹泻主要是由轮状病毒感染引起的，多发于每年()。……………参考答案：B

A、6-7月

B、9-11月

C、1-2月

D、3-4月

72、秋季腹泻发病者多见于()以下尤其是半岁以内的婴幼儿。……………参考答案：A

A、4岁

B、3岁

C、2岁

D、1岁

73、中度脱水患儿表现()。……………参考答案：B

A、精神稍差，略有烦躁不安

- B、精神萎靡或烦躁不安
- C、呈重病容，精神极度萎靡
- D、表情淡漠，昏睡甚至昏迷

74、水痘分期分批的长出，此起彼伏，为期（ ）天。……………参考答案：C

- A、3-4
- B、5-6
- C、8-10
- D、10-14

75、腮腺炎护理：注意休息，直到腮腺肿大（ ）为止。……………参考答案：A

- A、完全消失
- B、开始消退
- C、部分消退
- D、单侧消退

76、婴幼儿夜惊时不会出现（ ）。……………参考答案：D

- A、抽搐
- B、尖叫
- C、在床上翻滚
- D、与他人对话有反应

77、选择和改编婴幼儿粗大动作游戏的形式要（ ）。……………参考答案：C

- A、单一
- B、少见
- C、重复性强
- D、稀奇

78、公鸡走路的游戏是婴儿（ ）动作训练。……………参考答案：D

- A、走
- B、跑
- C、跳
- D、平衡

79、陀螺球的游戏是婴儿（ ）动作训练。……………参考答案：C

- A、抓握

- B、拍打
- C、拨
- D、投入

80、婴儿眼睛发育特点不包括（ ）。……………**参考答案：C**

- A、眼睛发育不完善
- B、眼睛调节能力强
- C、眼球前后径大
- D、眼睛容易近视

81、新生儿出生时还不会说话，到（ ）左右，已经可以说出和理解 1000 多个词汇。……………

参考答案：D

- A、1 岁
- B、2 岁
- C、2.5 岁
- D、3 岁

82、新生儿脑重只有 350~390g，3 岁时已达（ ）左右，接近成人脑重量。……**参考答案：A**

- A、1000g
- B、800g
- C、900g
- D、700g

83、（ ）严重者会导致小儿手指畸形，或影响下颌发育，上下牙齿咬合畸形。…**参考答案：A**

- A、吮手指
- B、暴怒发作
- C、习惯性擦腿动作
- D、屏气发作

84、（ ）又称呼吸暂停症，为婴幼儿时期的一种呼吸方面的行为异常，以婴幼儿在情绪急剧变化时出现呼吸暂停为主要特征。……………**参考答案：C**

- A、暴怒发作
- B、攻击行为
- C、屏气发作
- D、吮手指

85、屏气发作最多见于（ ）幼儿。……………**参考答案：A**

- A、2-3 岁
- B、4-5 岁
- C、6-7 岁
- D、8-9 岁

86、（ ）的特点是活泼、好动、敏感、反应迅速、喜欢与人交往、兴趣容易变换。……………

参考答案：C

- A、少血质
- B、胆汁质
- C、多血质
- D、抑郁质

87、（ ）的特点是直率、热情、精力旺盛、易于冲动，动作剧烈。……………**参考答案：D**

- A、多血质
- B、抑郁质
- C、少血质
- D、胆汁质

88、（ ）的特点是安静、稳重、动作缓慢、不易激动、情绪不容易外露。……………**参考答案：C**

- A、抑郁质
- B、多血质
- C、黏液质
- D、少血质

89、生长发育消耗的能量是儿童特有的，在出生后的 3 个月内约（ ）的能量用于生长发育。……………**参考答案：A**

- A、0.3
- B、0.2
- C、0.4
- D、0.25

90、1g 脂肪可提供（ ）能量，是蛋白质和碳水化合物(1g 提供 4kcal 能量)的 2.25 倍。……………**参考答案：B**

- A、8kcal

- B、9kcal
- C、7kcal
- D、10kcal

91、母乳中脂肪提供的能量占总能量摄入的（ ）。……………**参考答案：C**

- A、0.4
- B、0.6
- C、0.5
- D、0.7

92、列入我国计划免疫并免费提供的五种疫苗分别预防（ ）种疾病。……………**参考答案：C**

- A、5
- B、6
- C、7
- D、8

93、儿童是计划免疫的主要对象，目的是通过预防接种使儿童自身产生对一些（ ）的免疫力。……………**参考答案：B**

- A、风湿病
- B、传染病
- C、免疫缺陷病
- D、心理疾病

94、经过预防接种注射后，这些人群即使染上疾病，病情也会比较轻，不至于造成严重的（ ）。……………**参考答案：C**

- A、免疫率
- B、合并症
- C、并发症
- D、病死率

95、（ ）是指一个人在生活中对待别人、对待自己、对待事物，甚至对待整个环境所表现出来的独特个性。……………**参考答案：C**

- A、感受
- B、人文
- C、人格

D、行为

96、婴幼儿的认知具有直觉、行动、()的特点。……………参考答案: C

A、虚拟形象

B、抽象形象

C、具体形象

D、虚无形象

97、()的婴幼儿是社会性行为和个人情感培养的最佳时期。……………参考答案: B

A、1岁以前

B、3岁以前

C、6岁以前

D、10岁以前

98、科学研究显示,()是一切心理现象产生和发展的物质基础。……………参考答案: C

A、精神

B、心理

C、大脑

D、小脑

99、()是婴幼儿出生后接触最早的教养环境,也是婴幼儿全面发展的最初场所。……………

参考答案: D

A、医院

B、早教中心

C、游泳馆

D、家庭

100、发展重点手的抓握能力适用于()。……………参考答案: B

A、0-3个月

B、0-6个月

C、6-18个月

D、18-36个月

101、育婴员在照料婴幼儿的过程中必然会接触到各种电器,也需要熟练使用相关家用电器提高工作效率和()。……………参考答案: B

A、数量

- B、质量
- C、质料
- D、方法

102、即使对产品已经掌握，第一次使用时不能直接在婴幼儿身上试用，避免误操作对婴幼儿造成不必要的（ ）。……………**参考答案：C**

- A、侵犯
- B、保护
- C、伤害
- D、爱护

103、对已经开始能够理解成人指令的婴幼儿，不妨采用消退的方法，让他们认识到玩弄家用电器的（ ）。……………**参考答案：D**

- A、安全
- B、平安
- C、保险
- D、危险

104、一度烫伤的症状是（ ）。……………**参考答案：A**

- A、红斑
- B、小水泡
- C、大水泡
- D、焦痂

105、二度烫伤的症状是（ ）。……………**参考答案：C**

- A、正常
- B、红斑
- C、水泡
- D、焦痂

106、抢救失血伤员时，应先进行（ ）。……………**参考答案：C**

- A、观察
- B、包扎
- C、止血
- D、询问

107、()是国家为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，根据宪法而制定颁布的法律。……………**参考答案：B**

- A、《母婴保健法》
- B、《劳动法》
- C、《食品安全法》
- D、《儿童权利公约》

108、《劳动法》自()起施行。……………**参考答案：D**

- A、1992
- B、1993
- C、1994
- D、1995

109、《劳动法》规定的劳动者每日工作时间不超过()小时。……………**参考答案：C**

- A、4
- B、6
- C、8
- D、10

110、《母婴保健法》于()中华人民共和国主席令第三十三号公布。……………**参考答案：D**

- A、1991
- B、1992
- C、1993
- D、1994

111、《母婴保健法》自()起施行。……………**参考答案：D**

- A、1992
- B、1993
- C、1994
- D、1995

112、有不满()婴儿的妇女，所在单位应当在劳动时间内为其安排一定的哺乳时间。……………**参考答案：A**

- A、1 周岁
- B、2 周岁
- C、3 周岁

D、4 周岁

113、对有过敏家族史的婴儿，相应推迟辅食尤其是蛋白质类辅食的添加时间。蒸蛋最好满（ ）个月后添加。……………**参考答案：B**

A、1

B、9

C、3

D、24

114、添加辅食应由少量开始，以降低引起过敏的风险。观察（ ）天没有过敏反应，再逐渐加量。……………**参考答案：A**

A、4~5

B、1~2

C、8~10

D、10~12

115、（ ）不是婴幼儿食物过敏反应。……………**参考答案：C**

A、湿疹

B、呕吐

C、食欲突然增加

D、腹泻

116、为婴幼儿选择牙刷，应选择（ ）适应宝宝的开口大小，在口腔中可以灵活转动。……………**参考答案：C**

A、电动牙刷

B、成人牙刷

C、小牙刷

D、大牙刷

117、如果使用不当或过于用力，大牙刷最易伤到宝宝的（ ）。……………**参考答案：D**

A、眼睛

B、食道

C、胃粘膜

D、口腔

118、牙刷使用一段时间后，牙刷毛会卷曲、破损，建议每（ ）个月更换一次。……………

参考答案：B

- A、1
- B、3
- C、6
- D、9

119、() 不属于婴幼儿龋齿治疗措施。……………参考答案：D

- A、矫正
- B、药物治疗
- C、填充
- D、戴牙套

120、严禁在家庭使用() 装杀虫剂、洗涤剂，以免误食。……………参考答案：A

- A、饮料瓶
- B、化学试剂瓶
- C、专用消毒剂瓶
- D、试剂原装瓶

121、在() 情况下，可不给婴儿穿反光材料附件的衣物。……………参考答案：C

- A、黎明
- B、黄昏
- C、晴天
- D、雨天

122、如果婴幼儿不小心被烫伤，应()。……………参考答案：D

- A、涂酱油
- B、涂紫药水
- C、迅速撕拉烫伤部位衣服
- D、迅速脱离热源后用凉水降温

123、玩辨听各种声音的游戏，一起敲敲鼓和小铃的是()。……………参考答案：C

- A、婴幼儿可以在边听成人唱童谣边看示范的情况下进行下肢活动
- B、如“看我摸”，童谣
- C、让婴幼儿闭眼听三种声音，如小铃、小鼓及木鱼，敲击后、请婴幼儿说出声音的发出顺序。
- D、可以在门口和婴幼儿玩“小兔子乖乖”的游戏。

124、不适合 19~24 个月婴幼儿开展童谣唱游活动的是()。……………参考答案: D

- A、伴随语言、认知、模仿的童谣唱游
- B、玩辨听各种声音的游戏, 一起敲敲鼓和小铃
- C、伴有踏步、停下等下肢动作的童谣唱游
- D、指指认认唱说童谣

125、() 婴幼儿动作与音乐的协调能力逐渐提高, 容易掌握铃鼓和串铃的演奏方法, 随乐能力有所发展, 有时能做到“合拍”; 初步理解音乐所表达的情绪, 并开始产生初步的想象和联想……………参考答案: D

- A、10~12 个月
- B、13~18 个月
- C、19~24 个月
- D、25-36 个月

126、() 婴幼儿父母亲每天下班时, 可以在门口和婴幼儿玩“小兔子乖乖”的游戏。当父母亲用粗粗的声音唱时, 婴幼儿判断这是大灰狼假扮, 不可以开门; 而用轻柔声音唱时, 婴幼儿判断是爸爸或妈妈回来了, 可以开门的游戏。……………参考答案: D

- A、10~12 个月
- B、13~18 个月
- C、19~24 个月
- D、25-36 个月

127、25-36 个月婴幼儿喜欢()。……………参考答案: A

- A、更多有规则或认知的童谣
- B、唱歌
- C、跳舞
- D、弹琴

128、“我是红色宝宝”的游戏是婴儿()训练。……………参考答案: D

- A、发音
- B、回答问题
- C、认物
- D、认识颜色

129、5 个月婴儿认物训练的游戏是()。……………参考答案: C

- A、小手拍拍
- B、欢迎再见
- C、认识物体
- D、图谱阅读“弯弯腰”

130、因为婴儿的重要学习方式是()，所以育婴师要扩大正面强势的影响，消灭负面强势的影响。……………**参考答案：A**

- A、模仿学习
- B、体育活动
- C、看书活动
- D、一对一的教学

131、不属于婴儿情绪发展的特点的是()。……………**参考答案：D**

- A、婴儿情绪发展与先天的气质有关，与后天的成长环境也有关系
- B、情绪发展有一定的生理基础
- C、婴儿情绪反应快而缺乏控制力
- D、婴儿能够很好的控制自己的情绪

132、不是两三岁婴幼儿的情绪是()。……………**参考答案：D**

- A、快乐
- B、愤怒
- C、好奇
- D、担心

133、属于情绪是指()。……………**参考答案：A**

- A、对主观态度和体验的较短暂状态
- B、稳定、持续的态度反映
- C、责任感
- D、道德观

134、加拿大心理学家布里奇斯的情绪分化理论：情绪分化为愤怒、厌恶和恐惧的年龄是()。……………**参考答案：D**

- A、12个月以后
- B、18个月以后
- C、3个月以后

D、6个月以后

135、加拿大心理学家布里奇斯的情绪分化理论：快乐的情绪又分化为高兴和喜爱年龄是()。……………**参考答案：B**

A、6个月以后

B、12个月以后

C、18个月以后

D、3个月以后

136、加拿大心理学家布里奇斯的情绪分化理论：婴儿的情绪分化为快乐和痛苦的年龄是()。……………**参考答案：A**

A、3个月以后

B、6个月以后

C、12个月以后

D、18个月以后

137、婴幼儿时期的()是所有能力、情感、行为习惯发展的基础，是今后学习求知的基础。……………**参考答案：C**

A、动作技能

B、语言表达能力

C、认知能力

D、社会性行为和情感培养

138、()要引导婴幼儿学习在群体中与别人相处，培养婴幼儿健康、稳定的情绪。……………
参考答案：B

A、认知能力

B、社会性行为和情感培养

C、动作技能

D、语言表达能力

139、抑扬顿挫，不剩耳，声音响亮，节奏感强，无泪液流出的哭声是()。……………**参考
答案：D**

A、饥饿的啼哭

B、尿湿性啼哭

C、困倦性啼哭

D、正常的啼哭

140、啼哭一般很强烈，而且还略有颤抖和跳跃，一声声不耐烦地嚎叫的哭声是（ ）。……………**参考答案：B**

A、尿湿性啼哭

B、困倦性啼哭

C、正常的啼哭

D、饥饿的啼哭

141、常在吃完奶或睡醒后，啼哭强度较轻，无泪，哭的同时，两腿蹬被，有时边哭边活动小屁股的哭声是（ ）。……………**参考答案：D**

A、困倦性啼哭

B、正常的啼哭

C、饥饿的啼哭

D、尿湿性啼哭

142、（ ）婴儿出现有差别的微笑。婴儿只对亲近的人笑，或者对熟悉的人脸比对不熟悉的人脸笑得更多。……………**参考答案：C**

A、2个月左右

B、3个月左右

C、4个月左右

D、5个月左右

143、3岁时婴幼儿的微笑较多是（ ）。……………**参考答案：B**

A、触觉刺激

B、社交性

C、社会性刺激

D、视觉刺激

144、新生儿在（ ）时，开始出现清醒时间的诱发笑。比如轻轻触摸或吹其皮肤敏感区4~5秒钟，即可出现微笑。……………**参考答案：C**

A、第1周

B、第2周

C、第3周

D、第4周

145、婴儿受到语言和动作的刺激，到了()时会自动配合换尿布，这是成人与婴儿交往获得的回报。……………**参考答案：B**

- A、1~3个月
- B、4~5个月
- C、6~8个月
- D、8个月后

146、面对面和婴儿讲话，张嘴闭嘴多次重复的动作会诱引婴儿模仿张口动嘴的兴趣。心理学家称这种动作为()。……………**参考答案：A**

- A、共鸣动作
- B、张嘴动作
- C、回应动作
- D、模仿动作

147、与婴幼儿交流的最好形式是()。……………**参考答案：B**

- A、说
- B、玩
- C、处理婴儿大小便
- D、洗手洗脸

148、和新生婴儿面对面温柔的注视的最佳距高为()。……………**参考答案：B**

- A、10-20cm
- B、20-30cm
- C、30~40cm
- D、40-50cm

149、育婴员还可以一边说话，一边慢慢移动自己的面部，让婴幼儿的头和眼球随你而转动的训练有助于婴幼儿的()。……………**参考答案：B**

- A、动作发展
- B、智力开发和感觉发展
- C、视觉发展
- D、运动发展

150、在婴幼儿生活照顾中渗透情感交流的方法不应的是()。……………**参考答案：A**

- A、严肃的目光凝视

B、用温柔的语言和婴幼儿亲切地交流

C、在照料活动中与婴幼儿谈话

D、以表情与动作与婴幼儿交流、交流

151、关于生活中情感交流的渗透，以下不正确的是()。……………参考答案：B

A、用温柔的语言和和婴幼儿在注视中亲切交流

B、在照料活动中不要和婴幼儿说话

C、哺乳时尽量与婴幼儿肌肤相亲

D、安全的关系与环境是与婴幼儿进行良好交流的基础

152、()是培养婴儿良好情绪的正确方法。……………参考答案：B

A、对婴儿的一切要求都要满足

B、不要把成人的不满情绪发泄到婴儿身上，更不能冷落甚至打骂婴儿

C、控制婴儿的活动场地，不让他们随意走动

D、婴儿不听话时可以吓唬或哄骗他们

153、()不属于指导家长与婴儿建立亲密关系的正确方法。……………参考答案：D

A、在喂奶时与婴儿进行交流

B、用眼睛相互注视进行交流

C、经常给予婴儿更多的爱抚、亲吻和拥抱

D、婴儿哭闹时家长要责令其停止

154、婴幼儿暴怒发作时可对其采用()，但必须保证婴幼儿的安全。……………参考答案：A

A、暂时隔离法进行冷处理

B、寻找原因，对因治疗

C、说服教育、诱导解释

D、耐心说服教育

155、出现婴幼儿出现吮手指行为时，不恰当的处理是()。……………参考答案：D

A、用玩具，图画等孩子喜爱之物吸引其注意力

B、用愉快的动手游戏中转移吮手指的习惯

C、纠正不良的睡眠习惯，不要过早让没有睡意的婴幼儿上床

D、用简单粗暴的方法制止

156、不属于婴幼儿攻击性行为的是的()。……………参考答案：A

A、大哭大闹

- B、打人、咬人
- C、抓人
- D、夺取别人东西

157、()是生物作为集体活动的个体，是人不能脱离社会而孤立生存的属性。…参考答案：B

- A、自然性
- B、社会性
- C、反社会性
- D、生物性

158、通常把对人类整体运行发展不利的基本特性称为人的()。……参考答案：B

- A、社会性
- B、反社会性
- C、生物性
- D、自然性

159、通常把一些对人类整体运行发展有利的基本特性称为人的()。……参考答案：D

- A、反社会性
- B、生物性
- C、自然性
- D、社会性

160、可以帮助婴儿克服害羞和认生现象的方法()。……参考答案：A

- A、对婴儿的自我表现及时给表扬和鼓励
- B、要经常当众指出婴儿的错误
- C、对于婴儿的错误要严厉的批评，并要求婴儿马上改正
- D、对婴儿的自我表现及时制止

161、若婴幼儿有过度害羞的毛病，()扮演的角色就很重要。……参考答案：B

- A、育婴员
- B、父母
- C、教师
- D、爷爷奶奶

162、造成婴幼儿害羞的自身因素有()。……参考答案：C

- A、熟悉的环境

- B、外界因素
- C、身体过胖
- D、家庭因素

163、() 婴幼儿试图模仿一些发音和连贯的词，叫爸爸、妈妈、敲打玩具，还会模仿成人咳嗽，用口唇发嘘的声音……………**参考答案：B**

- A、5~6 个月
- B、7~8 个月
- C、9~10 个月
- D、11~12 个月

164、() 婴幼儿特别喜欢学各种动物或物体发出的叫声，如小狗叫、小猫叫，汽车喇叭声、火车鸣笛声等。……………**参考答案：C**

- A、6~12 个月
- B、1 岁
- C、1~2 岁
- D、2~3 岁

165、() 婴幼儿想学爸爸妈妈是如何使用电话、钥匙、瓶瓶罐罐和电视遥控器。……………**参考答案：D**

- A、6 个月左右
- B、1 岁左右
- C、1.5 岁左右
- D、2 岁以后

166、() 婴幼儿就会开始展示模仿游戏，疯狂地模仿周围的人，并显得乐在其中。……………**参考答案：D**

- A、1 岁左右
- B、1.5 岁左右
- C、2 岁以后
- D、3 岁以后

167、人生的第一次反抗期，大约出现在()。……………**参考答案：D**

- A、6 个月
- B、1 岁

C、1.5岁

D、2岁

168、在婴幼儿第一“反抗期”，对婴幼儿的合理需求，尤其是学习和探索环境的欲望要给予充分的满足。这是()。……………**参考答案：B**

A、转移注意法

B、合理满足法

C、故意冷淡法

D、后果惩罚法

169、1岁半至2岁半的婴幼儿希望自己的行为得到认同，自己的探索活动不受到限制或干涉，有时会表现出一种()。……………**参考答案：B**

A、亲和行为

B、抗拒行为

C、黏人行为

D、随和行为

170、()孩子知道应该帮助人，也愿意表达乐于助人的意愿的利社会行为。……**参考答案：D**

A、6-12个月

B、1岁

C、1~2岁

D、2~3岁

171、以下不利于婴幼儿玩伴关系建立的是()。……………**参考答案：C**

A、为婴幼儿提供与同伴一起玩的机会

B、安排两个人合作的游戏

C、让婴幼儿独享食物和玩具

D、指导婴幼儿玩“角色游戏”

172、()婴幼儿的利社会行为反应更加明显。……………**参考答案：D**

A、6~12个月

B、1岁

C、1~2岁

D、2~3岁

173、婴幼儿动手抢别人手上的物品主要的目的是()……………**参考答案：C**

- A、想伤害人
- B、攻击
- C、夺取物品
- D、引人注目

174、婴幼儿时期的攻击行为() 敌意。……………参考答案：B

- A、多有
- B、多没有
- C、偶尔
- D、经常

175、() 婴幼儿经常为了抢玩具，而有意图地伤害同伴。……………参考答案：D

- A、1~2 岁
- B、2~3 岁
- C、3~4 岁
- D、3~5 岁

176、通过()，可以提高婴儿社会交往的技巧。……………参考答案：D

- A、到别人家作客时不论婴儿有什么不良行为都不要批评他
- B、家长不用教，婴儿长大就会明白
- C、婴儿乱翻别人东西时要严厉的呵斥他
- D、让婴儿学会使用文明礼貌用语

177、父母应避免()以下的婴幼儿成为电视儿童，否则坏习惯将很难根除。……参考答案：D

- A、6 个月
- B、1 岁
- C、1.5 岁
- D、2 岁

178、()是培养婴儿社会交往的最佳方法。……………参考答案：C

- A、婴儿与同伴发生冲突时，成人要及时干预
- B、不让婴儿与陌生人在一起
- C、让婴儿学会与人交换、分享和等待等习惯
- D、不带婴儿到陌生的环境中去

179、婴幼儿的社会性发展主要表现在()。……………参考答案：D

- A、生活中
- B、游戏中
- C、交往中
- D、生活和游戏中的交往、配合等行为

180、游戏中的人际关系有利于婴幼儿()的发展……………参考答案：A

- A、交往技能
- B、社会认知
- C、亲子关系
- D、自我认知

181、下列不属于游戏促使社会性方面和实践经验发展是内容是()。……………参考答案：D

- A、婴幼儿自我认知的发展
- B、社会认知的发展
- C、亲子关系
- D、精细动作的发展

182、婴幼儿“交换礼物”游戏的功能是()。……………参考答案：A

- A、促进社会交往能力发展
- B、促进假想能力的发展
- C、促进精细动作的发展
- D、促进情商的发展

183、育婴员可以让孩子来扮演洋娃娃的妈妈，鼓励婴幼儿给洋娃娃烧饭，喂饭、洗脸、洗澡、洗衣、抱娃娃出去玩，陪娃娃睡觉的游戏是()。……………参考答案：A

- A、娃娃家
- B、交换社物
- C、找妈妈
- D、谁在叫宝宝

184、2岁的宝宝不肯把自己的玩具和小朋友进行交换，正确的做法是()。……………参考答案：D

- A、不责怪
- B、强行宝宝交换
- C、多鼓励
- D、不强行宝宝交换

185、专心进食的益处不包括（ ）。……………参考答案：C

- A、有助于食物的细嚼慢咽
- B、有助于食物的营养吸收
- C、注意力不集中
- D、有助于进餐时间的控制

186、婴幼儿每次进餐的时间一般控制在（ ）分钟。……………参考答案：A

- A、20~30
- B、5~15
- C、40~60
- D、60~80

187、（ ）不属于2岁以上的婴幼儿的餐前动作。……………参考答案：D

- A、进餐前洗手
- B、摆碗筷
- C、摆凳子
- D、剧烈运动

188、鼓励婴幼儿从（ ）个月开始，自己从盘子里手抓食物进食，为以后用勺子吃饭打下基础。……………参考答案：B

- A、2
- B、7
- C、3
- D、4

189、放手让（ ）个月的婴幼儿自己尝试用匙进餐。……………参考答案：A

- A、12~15
- B、3~6
- C、1~3
- D、6~9

190、对（ ）的婴幼儿应要求熟练用匙进食。……………参考答案：C

- A、3~6个月
- B、1~3个月
- C、1岁半~2岁

D、6~9 个月

191、出生（ ）个月之内无论是母乳喂养还是人工喂养，婴儿都以吮吸流质为主。……………

参考答案：D

A、1

B、2

C、3

D、4

192、（ ）个月之后，可以开始添加少量米粉、蛋黄、鱼泥，实现饮食习惯从完全吮吸流质到开始学习用匙吃泥状食物的转变。……………**参考答案：A**

A、4

B、8

C、10

D、12

193、（ ）个月的婴幼儿可以开始吃固体食物。……………**参考答案：B**

A、1

B、10

C、3

D、6

194、大约到了（ ）个月后，婴儿会自己吃块状食物时，就想自己用手抓起来往嘴里放，并把块状食物咀嚼后吞咽下去。……………**参考答案：D**

A、1

B、2

C、3

D、9

195、一般到了（ ）个月的时候婴幼儿就能自己独立地吃饭了。……………**参考答案：C**

A、1

B、3

C、15

D、6

196、婴幼儿开始拿匙吃饭的只是感兴趣和学习，不能喂饱自己，所以通常的做法是给婴幼儿

一个匙让其学习并适时地 ()。……………参考答案: B

- A、批评
- B、鼓励、赞扬
- C、哄骗
- D、威胁

197、婴幼儿就餐气氛要 ()。……………参考答案: C

- A、嘈杂
- B、紧张
- C、轻松愉快
- D、吵闹

198、当婴幼儿不配合时,不 (),以免造成小儿厌食、拒食。……………参考答案: D

- A、赞赏
- B、鼓励
- C、表扬
- D、恐吓

199、良好的感官刺激能引起婴幼儿的食欲和心理满足,唤起对食物的兴趣。因此需要尽量注意食物的 ()。……………参考答案: C

- A、热度
- B、温度
- C、色彩
- D、热量

200、优质蛋白占总蛋白 ()。……………参考答案: C

- A、0.1
- B、0.3
- C、0.5
- D、0.7

201、婴幼儿应 () 摄入含五大类 (粮谷类、动物类、奶类和豆类、蔬菜和水果、调味类) 食物。……………参考答案: A

- A、每日
- B、隔日

C、隔周

D、隔月

202、下列食物中不含膳食纤维的是（ ）。……………参考答案：C

A、谷类

B、蔬菜

C、肉类

D、水果

203、在积极的社会环境下，幼儿对食物的接受度将（ ）。……………参考答案：D

A、减少

B、削减

C、下降

D、增加

204、（ ）进食将导致幼儿排斥富有营养的食物。……………参考答案：A

A、强迫

B、自愿

C、主动

D、自觉

205、婴幼儿在家里进餐时，要注意离开游戏区域，也要避免在电视机旁（ ）。……………

参考答案：D

A、安静用餐

B、专心用餐

C、专注用餐

D、边看边吃

206、属于婴幼儿进餐时的不良习惯是（ ）。……………参考答案：C

A、细嚼慢咽

B、注意力集中

C、边吃边玩

D、专心用餐

207、婴幼儿在家里进餐时，要注意（ ）游戏区域。……………参考答案：B

A、靠近

- B、离开
- C、挨近
- D、接触

208、控制婴幼儿吃零食，在饭前（ ）内不吃零食。……………参考答案：C

- A、十分钟
- B、三十分钟
- C、一个半小时
- D、三小时

209、胃排空的时间随食物种类不同而有所差异，水的排空时间约为（ ）小时，母乳为2~2.5小时，牛奶或配方奶为3~4小时。……………参考答案：A

- A、1~1.5
- B、2~2.5
- C、3~3.5
- D、4~4.5

210、食物吸收的主要部位是小肠上段的十二指肠和（ ）。……………参考答案：B

- A、回肠
- B、空肠
- C、乙状结肠
- D、直肠

211、婴儿肠道为革兰氏阳性杆菌占绝对优势，其中（ ）以上为双歧杆菌，是最重要的肠道有益菌。……………参考答案：D

- A、0.3
- B、0.5
- C、0.7
- D、0.9

212、幼儿有（ ）摄入需求的判断能力。……………参考答案：C

- A、氨基酸
- B、脂肪
- C、能量
- D、葡萄糖

213、在积极的社会环境下，幼儿对食物的接受度将增加，而（ ）进食将导致幼儿排斥富有营养的食物。……………参考答案：B

- A、鼓励
- B、强迫
- C、表扬
- D、主动

214、幼儿的进食技能发育与婴儿期的（ ）相关。……………参考答案：D

- A、跑步
- B、歌唱
- C、玩玩具
- D、训练

215、以下（ ）不是常见必须的微量元素。……………参考答案：D

- A、铁
- B、锌
- C、碘
- D、脂肪

216、（ ）为必须脂肪酸，对婴幼儿的视力、认知发育有促进作用。……………参考答案：A

- A、亚麻酸
- B、葡萄糖
- C、钙
- D、铁

217、（ ）不是食物中的三大产热营养素。……………参考答案：C

- A、碳水化合物
- B、脂肪
- C、维生素
- D、蛋白质

218、婴幼儿食物不宜采用（ ）的烹调方式。……………参考答案：B

- A、蒸
- B、油炸
- C、煮

D、炖

219、() 不适宜婴幼儿饮用。……………**参考答案：D**

A、牛奶

B、白开水

C、果汁

D、含糖碳酸饮料

220、夏季气温高、出汗多，应以() 食物为主，多选择能够补充体内水溶性维生素 B 和维生素 C 的食物。……………**参考答案：C**

A、油焖

B、炭烤

C、清淡

D、油炸

221、() 富含碘，碘是合成甲状腺素的原料，可预防甲状腺功能低下导致的智力发育落后和生长迟滞。……………**参考答案：A**

A、海藻

B、青菜

C、牛奶

D、猪肉

222、海藻多糖能延缓胃排空和食物通过小肠的时间，有助于调节()，控制体重，对肥胖儿童有益。……………**参考答案：C**

A、智力

B、视力

C、血糖

D、身高

223、婴幼儿患有缺铁性贫血时候，编制食谱中应考虑含() 丰富的食物如肝脏、动物血。……………**参考答案：B**

A、脂肪

B、铁

C、氨基酸

D、维生素

224、() 不能提供丰富的膳食纤维。……………参考答案: D

- A、豆类
- B、根茎类
- C、杂粮
- D、脂肪

225、婴幼儿在疾病恢复期, 应注意补充充足的() 和热量。……………参考答案: A

- A、蛋白质
- B、脂肪
- C、胆固醇
- D、甘油三酯

226、() 的孩子保证每日 400~500ml 奶的摄入。……………参考答案: C

- A、超重
- B、个子高
- C、个子偏矮、生长迟缓
- D、肥胖

227、7~12 个月婴儿辅食不好用() 搭配。……………参考答案: D

- A、肉
- B、鱼
- C、禽
- D、炸猪油

228、7~12 个月婴儿膳食原材料不包括()。……………参考答案: B

- A、主食
- B、榨菜
- C、副食
- D、调味料

229、1 岁以内婴儿膳食的调味料中不加()。……………参考答案: A

- A、盐
- B、油
- C、糖
- D、豆油

230、13~18 个月的婴幼儿宜多食 ()。……………**参考答案: D**

- A、含糖高的食品
- B、油炸食品
- C、腌腊食品
- D、营养丰富的食品

231、13~18 个月婴幼儿的膳食制作中可以开始少量加 ()。……………**参考答案: B**

- A、糖
- B、盐
- C、油
- D、肉

232、13~18 个月婴幼儿辅食不包括 ()。……………**参考答案: C**

- A、动物类食物
- B、蔬菜水果类
- C、油炸类
- D、奶类

233、传染病是由病原体感染 () 后引起的, 并能在人与人、动物与动物、人与动物间相互传播的疾病。……………**参考答案: B**

- A、动物
- B、人体
- C、昆虫
- D、植物

234、传染病患者在 () 不易把细菌或病毒传染给别人。……………**参考答案: D**

- A、潜伏期
- B、前驱期
- C、发病期
- D、恢复期

235、以下哪个不是呼吸道传染病的预防措施 ()。……………**参考答案: D**

- A、空气消毒
- B、戴口罩
- C、减少接触
- D、接种疫苗

D、管理粪便

236、哪个不是传染病流行的基本条件（ ）。……………参考答案：D

A、传染源

B、传播途径

C、人群易感性

D、预防接种疫苗

237、动物间的传染病传给人类引起的严重疾病不包括（ ）。……………参考答案：A

A、麻疹

B、狂犬病

C、鼠疫

D、血吸虫病

238、对某一传染病缺乏特异免疫力的人称为（ ）。……………参考答案：A

A、易感者

B、不易感者

C、感染者

D、传染者

239、病原体从传染源排出体外，经过一定的传播，到达与侵入新的易感者的过程称为（ ）。……………参考答案：D

A、人群易感性

B、病原携带者

C、隐性感染者

D、传播途径

240、哪个不是通过血液传播的传染病（ ）。……………参考答案：D

A、乙肝

B、丙肝

C、艾滋病

D、破伤风

241、哪个不是通过虫媒传播的传染病（ ）。……………参考答案：C

A、乙型脑炎

B、疟疾

- C、麻疹
- D、登革热

242、以下哪个不是虫媒传染病的预防措施（ ）。……………**参考答案：D**

- A、除四害
- B、防虫
- C、杀虫、驱虫
- D、餐具消毒

243、预防性消毒是指在没有明确的（ ）存在的情况下，对可能受到病原体污染的场所和物品所做的消毒。……………**参考答案：B**

- A、传染源
- B、感染源
- C、传播途径
- D、人群易感性

244、对传染病的接触者不正确的处理方法是（ ）。……………**参考答案：C**

- A、密切临床观察
- B、药物预防
- C、调整工作岗位
- D、预防接种疫苗

245、要求专职疫情管理员在发现甲类传染病（ ）内将传染病报告卡通过网络报告上级。……………**参考答案：B**

- A、1 小时
- B、2 小时
- C、3 小时
- D、4 小时

246、应对 1 岁左右婴幼儿的易怒，滥发脾气策略有（ ）。……………**参考答案：A**

- A、给他做示范，告诉他那些行为是正确的。
- B、没有按要求完成要进行批评指正
- C、说话的语气一定要严肃，
- D、及时指出错误，并给于一定的体罚

247、应对 2 岁左右婴幼儿的易怒，滥发脾气策略有（ ）。……………**参考答案：D**

- A、让他自己学会控制情绪
- B、必要时给于一定的体罚
- C、可以让他独自待在房间里悔过
- D、谨慎对待幼儿打发脾气，有时可以冷处理

248、婴幼儿的胆小和退缩，在公共场合或陌生场合表现得（），羞怯，见到陌生人会感到惶恐不安。……………**参考答案：C**

- A、易怒
- B、滥发脾气
- C、非常胆小
- D、厌恶

249、培养婴幼儿的安全感的措施（）。……………**参考答案：B**

- A、尽量不到公共场合
- B、尽量多与不同的人接触
- C、尽量和家人接触
- D、尽量不接触陌生人

250、应对婴幼儿胆小和退缩的策略包括（）等。……………**参考答案：A**

- A、培养他们的开朗性格
- B、包办所有事情
- C、少参与集体活动
- D、只跟熟悉的同伴完

251、说谎是婴幼儿成长过程的一个（）。……………**参考答案：B**

- A、不正常的现象
- B、正常的现象
- C、一段时间内的正常现象
- D、一段时间内特有的现象

252、3岁左右的婴幼儿正是（）的时候，常常会把想象的事当成真的来说。……**参考答案：C**

- A、想象力缺乏
- B、生活经验不足
- C、想象力丰富
- D、无意识记忆

253、应对婴幼儿的说谎行为，应（），教会婴幼儿解决问题的方法。……参考答案：D

- A、批评教育
- B、及时纠正
- C、进行适当的体罚
- D、避免惩罚和说教

254、在婴幼儿的攻击行为中，不属于（）的攻击行为。……参考答案：B

- A、模仿性
- B、反社会性
- C、取乐性
- D、习惯性

255、（）攻击性行为是婴幼儿的多次出现的攻击行为，又没有得到有效的矫正而养成的某种习惯。……参考答案：A

- A、习惯性
- B、手段性
- C、模仿性
- D、取乐性

256、给婴幼儿提供（）活动空间，尽量避免提供有攻击性倾向的玩具等，从而减少攻击性行为的产生。……参考答案：D

- A、封闭的
- B、狭小
- C、很大的
- D、较为宽敞

257、口吃主要是由于（）喉肌与发音有关的器官紧张及痉挛所造成的。……参考答案：A

- A、呼吸肌
- B、吞咽肌
- C、气管平滑肌
- D、食道括约肌

258、应对婴幼儿口吃的策略有（）等措施……参考答案：B

- A、要注意提醒他发生口吃的频次
- B、要求他放慢讲话速度

- C、必要时进行处罚或奖励
- D、早期口吃父母不要进行干预

259、应对婴幼儿口吃的策略有：有其他婴幼儿在场时，不要和别人议论他，（），……………

参考答案：C

- A、应进行早期教育，预防口吃的发生。
- B、重度口吃也不应干预，可以自愈
- C、不要模仿他的口吃
- D、要时时提醒他又发生口吃的次数，注意改正

260、上呼吸道感染。俗称“（）”是婴幼儿最常见的疾病。……………**参考答案：C**

- A、鼻炎
- B、咽喉炎
- C、感冒
- D、气管炎

261、婴幼儿上呼吸道感染，一般病程（）日，如果体温持续不退或病情加重，应考虑有并发症的发生。……………**参考答案：B**

- A、3-4
- B、3-5
- C、3-6
- D、3-7

262、支气管肺炎主要是由细菌感染引起，以（）为多见，病原体多由呼吸道浸入。……………

参考答案：D

- A、金黄色葡萄球菌
- B、绿农杆菌
- C、白色念珠菌
- D、肺炎链球菌

263、婴幼儿哮喘大多（）岁内起病。……………**参考答案：B**

- A、2
- B、3
- C、4
- D、6

264、婴幼儿哮喘起病较缓，发病前（）天常有上呼吸道感染。……………**参考答案：A**

- A、1-2
- B、1-3
- C、2-3
- D、2-4

265、婴幼儿哮喘发作常见的诱因（ ）。……………参考答案：D

- A、吃冷的食物
- B、流涕
- C、剧烈运动
- D、接触或吸入物如动物皮屑

266、脑性瘫痪患儿最基本的表现是（ ）。……………参考答案：D

- A、感觉障碍
- B、知觉障碍
- C、植物神经功能障碍
- D、运动障碍

267、可导致婴幼儿发生脑性瘫痪的病因有（ ）等。……………参考答案：A

- A、婴儿期感染或创伤
- B、遗传因素
- C、缺乏微量元素
- D、心理发育障碍

268、脑性瘫痪患儿常见的伴随症状不包括（ ）等。……………参考答案：C

- A、智力障碍、癫痫
- B、视力障碍、听力障碍
- C、睡眠障碍
- D、语言功能障碍

269、21-三体综合征又称唐氏综合征，是由（ ）引起一种疾病。……………参考答案：B

- A、遗传
- B、染色体畸形病变
- C、不良的生活习惯
- D、天气突变

270、孕妇年龄在（ ）岁时，婴儿患21-三体综合征的几率可达到5%。……………参考答案：D

- A、30
- B、35
- C、40
- D、45

271、21-三体综合征患儿的护理目的是（ ）。……………参考答案：C

- A、解决患儿的学习问题
- B、解决患儿家庭的实际生活问题
- C、患儿能逐步生活自理，从事简单的劳动
- D、解决患儿的生活环境问题

272、新生儿出生 24 小时开始出现吃过就吐，量较多，甚至呈喷射状，一般应考虑（ ）。……………参考答案：D

- A、吃奶过快
- B、喂奶后没有拍嗝
- C、吃奶后平睡
- D、颅内疾病或高位肠梗阻

273、婴幼儿频繁的呕吐可引起（ ）。……………参考答案：B

- A、腹胀
- B、脱水
- C、便血
- D、尿量增多

274、预防婴儿呕吐的护理措施（ ）等。……………参考答案：D

- A、尽量减少喂奶量
- B、喂奶后让其多活动
- C、尽快将需要奶量喂完
- D、喂奶后轻拍背部，将胃部的空气排出

275、婴幼儿腹泻的临床特点，错误的是（ ）。……………参考答案：D

- A、饮食不当可引起腹泻
- B、肠道感染可引起腹泻
- C、可表现为食欲不振
- D、大便次数减少，

276、不属于婴幼儿腹泻大便性状改变的是（ ）。……………参考答案：D

- A、呈黄色稀便
- B、黄绿色稀便
- C、黄白色或泡沫大便
- D、金黄色糊状大便

277、婴幼儿腹泻会造成食欲低下，严重者可出现（ ）。……………参考答案：A

- A、电解质紊乱
- B、食物中毒
- C、呼吸性碱中毒
- D、明显腹胀

278、佝偻病是婴幼儿缺乏（ ）产生以骨骼病变为特征的全身慢性营养性疾病…参考答案：D

- A、维生素 A
- B、铁
- C、锌
- D、维生素 D

279、婴幼儿佝偻病的预防措施正确的是（ ）等。……………参考答案：B

- A、进食高蛋白食物
- B、多进行户外活动
- C、多吃绿叶蔬菜
- D、多吃含维生素的食物

280、婴幼儿夏季进行户外活动时，应尽可能多的暴露皮肤的目的是促使皮肤合成（ ）。……………参考答案：D

- A、维生素 A
- B、维生素 B
- C、维生素 C
- D、维生素 D

281、缺铁性贫血多见于（ ）的婴幼儿……………参考答案：D

- A、3个月-1岁
- B、3个月-2岁
- C、6个月-1岁

D、6个月-2岁

282、胎儿期从母体所获得的铁以妊娠最后的（ ）个月为最多。……………参考答案：A

A、3

B、4

C、5

D、6

283、正常足月婴儿体内储存的铁及出生后红细胞破坏所释放的铁足够出生后（ ）月内造血的需要。……………参考答案：B

A、2-3

B、3-4

C、4-6

D、2-4

284、婴幼儿手足口病是由（ ）感染引起的疾病。……………参考答案：B

A、球菌

B、病毒

C、霉菌

D、细菌

285、婴幼儿手足口病常发生于（ ）。……………参考答案：C

A、一年的任何季节

B、春季

C、夏秋季

D、冬季

286、婴幼儿手足口病主要是通过（ ）传染。……………参考答案：D

A、空气

B、飞沫

C、血液

D、接触

287、婴幼儿麻疹病是由（ ）传播的呼吸道传染病。……………参考答案：C

A、流脑病毒

B、萨科齐病毒

C、麻疹病毒

D、脊髓灰质炎病毒

288、婴幼儿麻疹病多发生于（ ）。……………**参考答案：A**

A、冬春季

B、夏秋季

C、春夏季

D、秋冬季

289、婴幼儿麻疹病的潜伏期（ ）。……………**参考答案：D**

A、5-10 天

B、6-12 天

C、7-15 天

D、6-18 天

290、婴幼儿水痘多于（ ）高发。……………**参考答案：D**

A、夏秋季

B、春夏季

C、秋冬季

D、冬春季

291、婴幼儿水痘一般 1 岁以下较为少见，（ ）是水痘的高发年龄。……………**参考答案：B**

A、2-3 岁

B、3-4 岁

C、2-5 岁

D、3-5 岁

292、一般情况下，婴幼儿水痘潜伏期 14 天，病程（ ）天。……………**参考答案：D**

A、6-8

B、7-9

C、8-10

D、9-10

293、婴幼儿细菌性痢疾多流行于（ ）。……………**参考答案：B**

A、冬春季

B、夏秋季

C、春夏季

D、秋冬季

294、婴幼儿细菌性痢疾是常见的（ ）传染病。……………参考答案：A

A、肠道

B、呼吸道

C、血液

D、空气飞沫

295、婴幼儿细菌性痢疾的潜伏期（ ）。……………参考答案：C

A、数小时至数周

B、2-7天

C、数小时至8天

D、2-6天

296、我国最常见的病毒性肝炎是（ ）。……………参考答案：B

A、甲型病毒性肝炎

B、乙型病毒性肝炎

C、丙型病毒性肝炎

D、戊型病毒性肝炎

297、6个月内的婴幼儿很少患（ ）肝炎……………参考答案：A

A、甲型

B、乙型

C、丙型

D、戊型

298、婴幼儿乙型病毒性肝炎在我国的主要传播途径是（ ）。……………参考答案：D

A、粪-口传播

B、血液传播

C、体液传播

D、母婴传播

299、流行性腮腺炎俗称炸腮，四季均可流行，主要发生在（ ）。……………参考答案：A

A、冬春季

B、夏秋季

C、春夏季

D、秋冬季

300、流行性腮腺炎平均潜伏期为（ ）天。……………**参考答案：D**

A、10

B、12

C、16

D、18

301、流行性腮腺炎通过（ ）传播，婴幼儿为易感人群。……………**参考答案：B**

A、消化道

B、呼吸道

C、接触

D、血液

302、发生意外伤害时，因处理不当或延迟处理，也可造成残疾或死亡，下列哪项（ ）除外。……………**参考答案：D**

A、狗咬伤

B、骨折

C、毒蛇咬伤

D、扭伤

303、意外伤害急救处理的原则，下列哪项（ ）除外。……………**参考答案：D**

A、抢救生命

B、减少痛苦

C、预防并发症

D、保持冷静，等待救援

304、发生危及生命的意外伤害，首先关注的是（ ）。……………**参考答案：A**

A、呼吸、心跳

B、精神情况

C、体温

D、血压

305、新生儿出生时，其头部骨与骨之间的缝隙（ ）。……………**参考答案：C**

A、很窄

- B、较窄
- C、很大
- D、不大

306、婴幼儿由于骨骼（ ）的特点，可以做出许多成人无法做到的动作。……参考答案：A

- A、骨骼柔软
- B、骨骼可塑性强
- C、骨骼较短
- D、骨骼较硬

307、婴幼儿（ ）才逐渐出现骨化中心。……参考答案：C

- A、3个月
- B、4个月
- C、6个月
- D、7个月

308、目前，5岁以下婴幼儿死亡的第一位原因是（ ）。……参考答案：A

- A、意外伤
- B、铅中毒
- C、流行性疾病
- D、维生素中毒

309、骨折急救的原则，不正确的是（ ）。……参考答案：C

- A、先止血包扎，再固定骨折部位
- B、夹板内加垫衬
- C、开放性骨折的断端应先回纳组织后再固定
- D、夹板固定的长度必须超过上下两个关节

310、婴幼儿发生骨折时，错误的处理方法是（ ）。……参考答案：D

- A、止血
- B、包扎
- C、夹板固定
- D、揉捏骨折处

311、婴幼儿上肢骨折处理，不正确的是（ ）。……参考答案：D

- A、将骨折部位的上下两个关节固定

- B、上肢呈屈肘位固定
- C、维持上肢正常的功能位置
- D、上肢伸直固定

312、婴幼儿前臂骨折的固定，正确的处理是（ ）。……………**参考答案：A**

- A、夹板放于前臂的内侧，夹板的长度是一端要超过手心，另一端超过肘关节少许
- B、夹板放于前臂的下方，夹板的长度是一端要到腕关节，另一端超过肘关节少许
- C、夹板放于前臂的外侧，夹板的长度是一端到腕关节，另一端到肘关节
- D、夹板放于前臂的内侧，夹板的长度是一端到腕关节，另一端到肘关节

313、婴幼儿肱骨骨折的固定，正确的处理是（ ）。……………**参考答案：A**

- A、夹板放于上臂的内侧，夹板的长度是上端需到腋窝，另一端过肘窝
- B、夹板放于上臂的外侧，夹板的长度是上端到肩关节，另一端平肘处
- C、夹板放于上臂的内侧，夹板的长度是上端需到腋窝，另一端到腕关节
- D、夹板放于上臂的外侧，夹板的长度是上端需到肩关节，另一端到腕关节

314、婴幼儿大腿股骨骨折时，正确的处理是（ ）。……………**参考答案：A**

- A、夹板放在大腿内侧，上从大腿根部，下达内踝少许
- B、夹板放在大腿内侧，上从大腿根部，下达膝关节
- C、夹板放在大腿外侧，上从髌窝外，下达膝关节
- D、夹板放在大腿上方，上从大腿根部，下达内踝

315、婴幼儿小腿骨折时，正确的处理是（ ）。……………**参考答案：A**

- A、夹板放在小腿内侧，上自膝关节少许，下至内踝少许
- B、夹板放在小腿外侧，上自大髌前上棘，下至内踝少许
- C、夹板放在小腿内侧，上自大腿根部，下至外踝少许
- D、夹板放在小腿外侧，上自膝关节少许，下至内踝少许

316、婴幼儿下肢骨折处理正确的是（ ）。……………**参考答案：A**

- A、下肢牵引伸直固定
- B、下肢弯曲固定
- C、将骨折近端关节固定
- D、将骨折远端关节固定

317、婴幼儿头部骨折的症状，下列哪项（ ）除外。……………**参考答案：C**

- A、耳出血

- B、鼻出血
- C、消化道出血
- D、昏迷

318、婴幼儿头部骨折，应采取的体位是（ ）。……………参考答案：A

- A、头部稍高位
- B、去枕平卧位
- C、头低位
- D、去枕俯卧位

319、若婴幼儿头部先着地，下列哪项（ ）不是观察的内容。……………参考答案：D

- A、眼神发直
- B、嗜睡
- C、恶心、呕吐
- D、异常兴奋

320、无人照看是（ ）岁以下婴幼儿溺水死亡的重要原因。……………参考答案：D

- A、2岁
- B、3岁
- C、4岁
- D、5岁

321、发生溺水，属于婴幼儿自身的原因是（ ）。……………参考答案：D

- A、乘坐游船超载
- B、下水道井盖未盖
- C、游泳圈漏气
- D、婴幼儿独自外出玩耍

322、溺水婴儿的上岸后方的急救法错误的是（ ）。……………参考答案：D

- A、迅速清除口中污物
- B、立即抱起婴幼儿
- C、俯卧在急救者的肩上
- D、使腹部向上

323、溺水后平均（ ）分钟，呼吸、心跳会完全停止。……………参考答案：B

- A、2-3分钟

- B、5-6 分钟
- C、6-8 分钟
- D、8-10 分钟

324、溺水后，排出呼吸道积水的方法，下列哪项不正确（ ）。……………**参考答案：D**

- A、将溺水婴幼儿抱起，俯卧在施救者的肩上，快步奔跑
- B、将溺水婴幼儿俯卧于牛背上，取头低脚高位
- C、施救者可单脚跪地，将溺水婴幼儿俯卧在另一条屈曲的腿上，进行压背
- D、将溺水婴幼儿仰卧于大石头上，取头高脚低位

325、浅水中溺水婴幼儿的施救，不正确的是（ ）。……………**参考答案：A**

- A、施救者双手托住婴幼儿腰背部高举过头，使婴幼儿的腹部向上
- B、施救者双手托住婴幼儿腹部高举过头，使婴幼儿的腰背部向上
- C、将婴幼儿头和脚下垂，促使呼吸道内的水排出
- D、施救者双手不停的颤颤，可排出呼吸道积水，还能起到人工呼吸的作用

326、婴幼儿误服药物后（ ），应立即给其喝米汤、面糊。……………**参考答案：A**

- A、碘酒
- B、酒精
- C、感冒药
- D、盐酸

327、婴幼儿误服（ ）后，可催吐。……………**参考答案：D**

- A、强酸
- B、强碱
- C、昏迷
- D、农药

328、婴幼儿误服药物后，以免害怕而隐瞒真实情况导致误诊的做法错误的是（ ）。……………

参考答案：C

- A、态度和蔼的询问
- B、不应责怪婴幼儿
- C、应批评婴幼儿
- D、耐心的询问

329、高热惊厥多发生在（ ）岁。……………**参考答案：C**

- A、0-6 个月
- B、6-12 个月
- C、半岁-3 岁
- D、3-6 岁

330、高热惊厥的症状，下列哪项（ ）除外。……………参考答案：D

- A、双眼凝视
- B、意识丧失
- C、全身肌群强制性抽动
- D、烦躁

331、下列哪项（ ）不是高热惊厥护理要点。……………参考答案：A

- A、口服退热药物
- B、清除口鼻分泌物
- C、勿强行按压患儿肢体
- D、保持安静，避免声、光刺激

332、婴儿出牙常见的症状，下列哪项（ ）除外。……………参考答案：C

- A、低热
- B、烦躁
- C、出汗多
- D、流涎

333、婴幼儿生理性流涎常发生在（ ）个月。……………参考答案：D

- A、1-2 个月
- B、2-3 个月
- C、3-4 个月
- D、5-6 个月

334、婴幼儿乳牙出齐共（ ）颗。……………参考答案：A

- A、20
- B、25
- C、28
- D、32

335、下列哪项（ ）不是八纲辨证的内容。……………参考答案：D

- A、辨表里
- B、辨阴阳
- C、辨虚实
- D、辨正邪

336、脏腑辨证中五脏是（ ）。……………参考答案：A

- A、心
- B、胆
- C、胃
- D、肠

337、脏腑辨证中六腑是（ ）。……………参考答案：D

- A、肝
- B、肺
- C、肾
- D、膀胱

338、痰湿体质的表现，下列哪项（ ）除外。……………参考答案：C

- A、形体肥胖
- B、不喜活动
- C、毛发黑泽
- D、舌苔厚浊

339、内热体质的表现。下列哪项（ ）除外。……………参考答案：D

- A、面色红润
- B、大便干燥
- C、舌红苔厚
- D、舌苔薄白

340、正常体质的表现是（ ）。……………参考答案：A

- A、舌苔薄白
- B、肌肉松弛
- C、形体偏瘦
- D、形体肥胖

341、直推法多用于（ ）。……………参考答案：A

- A、头面部
- B、胸腹部
- C、腕掌部
- D、腰背部

342、按法的动作要领，下列哪项是错误的（ ）。……………参考答案：D

- A、按压的方向是垂直向下
- B、按压的力量由轻到重
- C、按压时着力部分要紧贴患儿体表的部位，不能移动
- D、按压的力量由重到轻

343、下列哪项（ ）不是捏法的注意事项。……………参考答案：A

- A、捏脊时用指端着力挤捏
- B、捏拿肌肤不可过度，用力过重易导致疼痛
- C、挤压向前移动时，需作直线移动
- D、捏脊时，不能将肌肤拧转或用指甲掐压肌肤

344、天门穴正确的定位是（ ）。……………参考答案：A

- A、两眉中间至前发际成一直线
- B、耳后入发际，乳突后缘高骨下凹陷中
- C、眉心至眉梢成一横线
- D、头正中线，入前发际 0.5 寸

345、人中穴常用于急救，下列哪项（ ）除外。……………参考答案：D

- A、不省人事
- B、窒息
- C、抽搐
- D、呼吸心跳停止

346、高骨穴常用于治疗（ ）。……………参考答案：A

- A、感冒头疼
- B、癫痫
- C、发热
- D、昏迷

347、下列哪项（ ）不是小儿推拿常用的介质。……………参考答案：D

- A、滑石粉
- B、爽身粉
- C、生姜汁
- D、酒精

348、推拿使用介质的目的，不正确的是（ ）。……………参考答案：A

- A、治疗疾病
- B、减轻摩擦
- C、避免皮肤损伤
- D、提高疗效

349、葱白汁用于（ ）推拿治疗。……………参考答案：D

- A、腹痛
- B、便秘
- C、头痛
- D、风寒感冒

350、下列哪项（ ）不是风寒感冒的表现。……………参考答案：C

- A、发热轻
- B、咳嗽咽痛
- C、鼻塞流黄涕
- D、无汗

351、下列哪项（ ）是风热感冒的表现。……………参考答案：B

- A、鼻塞流清涕
- B、面红目赤
- C、舌苔厚白
- D、大便腥臭

352、感冒的预防与护理不正确的是（ ）。……………参考答案：A

- A、多穿衣服，避免受凉
- B、加强锻炼，增强体质
- C、感冒流行期间，避免外出
- D、保持室内空气新鲜

353、下列哪项（ ）是伤食泻的表现。……………参考答案：A

- A、泻前哭闹
- B、泻下急迫
- C、食后即泻
- D、腹痛即泻

354、下列哪项（ ）是脾虚泻的表现。……………参考答案：A

- A、食后即泻
- B、腹痛即泻
- C、泻后痛减
- D、泻前哭闹

355、下列哪项（ ）不是湿热泻的表现。……………参考答案：D

- A、腹痛即泻
- B、肛门红肿
- C、泻下急迫
- D、泻后痛减

356、小儿推拿时间一般不超过（ ）分钟。……………参考答案：B

- A、10 分钟
- B、20 分钟
- C、30 分钟
- D、40 分钟

357、小儿推拿的时机，下列哪项除外（ ）。……………参考答案：D

- A、哭闹
- B、烦躁
- C、饭前 30 分钟
- D、饭后 1 小时

358、小儿推拿每天 1 次，高热等急性病可每天推拿（ ）次。……………参考答案：A

- A、2 次
- B、3 次
- C、4 次
- D、6 次

359、小儿推拿的对象一般是（ ）岁以下的小儿。……………参考答案：C

- A、2岁
- B、4岁
- C、6岁
- D、8岁

360、下列哪种（ ）疾病，经推拿后可导致出血加重。……………参考答案：A

- A、白血病
- B、哮喘
- C、猩红热
- D、水痘

361、有明显感染性疾病的患儿禁止推拿，下列哪项（ ）除外。……………参考答案：C

- A、丹毒
- B、骨髓炎
- C、支气管炎
- D、蜂窝组织炎

362、早吸吮的好处不包括（ ）。……………参考答案：B

- A、使产妇脑垂体释放缩宫素和催乳素
- B、增加奶胀的发生
- C、提供第一次动免疫
- D、早排胎粪

363、新生儿在出生1~3天内每次吸吮到（ ）毫升初乳即可满足其需要。……………参考答案：C

- A、5~10
- B、10~15
- C、10~20
- D、20~30

364、母乳不足时，3月龄婴儿应频繁吸吮，每日不少于（ ）次有助于乳汁分泌。……………

参考答案：D

- A、5
- B、6
- C、7
- D、8

365、人体经络里共有（ ）个主要的催乳穴。……………参考答案：D

- A、15
- B、18
- C、24
- D、31

366、头部的主要催乳穴有百会和（ ）。……………参考答案：A

- A、神庭
- B、风池
- C、云门
- D、天池

367、（ ）不是上肢的催乳穴。……………参考答案：D

- A、曲池
- B、合谷
- C、少泽
- D、足三里

368、按摩催乳推法的操作要点错误的是（ ）。……………参考答案：C

- A、紧贴体表
- B、平稳着实
- C、速度要快
- D、轻而不浮

369、按摩催乳指摩法动作宜轻快，频率为每分钟（ ）。……………参考答案：B

- A、100
- B、120
- C、140
- D、160

370、捏法有三指捏和（ ）。……………参考答案：C

- A、一指捏
- B、二指捏
- C、四指捏
- D、五指捏

371、气血虚弱型缺乳的原因是（ ）。……………参考答案：B

- A、肥胖
- B、产后大出血
- C、早产
- D、巨大儿

372、气血虚弱型缺乳按摩梳乳用指腹在（ ）方向轻轻梳乳5分钟。……………参考答案：B

- A、乳房上从近处向乳晕乳头方向
- B、乳房上从远处向乳晕乳头方向
- C、肩膀上从近处向乳晕乳头方向
- D、肩膀上从乳晕乳头往肩膀方向

373、气血虚弱型缺乳按摩自上而下捏脊3~5遍，双手捏（ ）3次。……………参考答案：A

- A、肩井
- B、少泽
- C、前谷
- D、合谷

374、乳汁淤积，如不及时处理易并发（ ）。……………参考答案：A

- A、乳腺炎
- B、乳腺癌
- C、少乳
- D、乳头皲裂

375、乳汁淤积在乳晕处施以（ ）。……………参考答案：A

- A、揉法
- B、捏法
- C、点法
- D、弹法

376、乳汁淤积需拿捏患侧胸大肌（ ）次。……………参考答案：C

- A、1~2
- B、2~4
- C、3~5
- D、5~6

377、通草用于（ ）。……………参考答案：A

- A、乳汁稀少
- B、乳汁过多
- C、乳头凹陷
- D、乳头皲裂

378、木通有致（ ）的副作用。……………参考答案：D

- A、心衰
- B、肝功能衰竭
- C、肺炎
- D、肾衰

379、橘皮无下乳之功，但出现（ ）时，服食颇宜。……………参考答案：B

- A、乳腺炎
- B、乳汁过多
- C、乳汁少
- D、乳头皲裂

380、不属于食疗通乳的原则是（ ）。……………参考答案：C

- A、因人制宜
- B、因时制宜
- C、因天制宜
- D、因地制宜

381、在猪蹄汤中加入（ ），催乳效果更显著。……………参考答案：B

- A、王不留行
- B、通草
- C、木通
- D、路路通

382、鲫鱼民间习惯用于（ ）。……………参考答案：A

- A、产后无乳
- B、乳腺炎
- C、奶胀
- D、乳汁不通

383、鲫鱼猪蹄通草汤主要功效错误的是（ ）。……………参考答案：D

- A、滋阴
- B、养血
- C、通乳
- D、补元阳

384、羊肉在（ ）称为补元阳、益血气。……………参考答案：A

- A、本草纲目
- B、黄帝内经
- C、伤寒论
- D、温病条编

385、木瓜鱼尾汤的鱼尾是（ ）。……………参考答案：D

- A、鲫鱼
- B、鲤鱼
- C、鳊鱼
- D、鲩鱼

386、对于营养不良的婴幼儿育婴员首先（ ）。……………参考答案：A

- A、帮助婴幼儿改变不良的饮食习惯
- B、了解进餐量
- C、进食速度
- D、对食物的偏好

387、血红蛋白在（ ）为贫血。……………参考答案：C

- A、10g
- B、11g
- C、12g
- D、13g

388、贫血需要补充铁剂和（ ）。……………参考答案：D

- A、维生素 a
- B、维生素 b
- C、维生素 c
- D、维生素 b12

389、对于单纯性肥胖儿进行饮食调节，控制体重的做法错误的是（ ）。……………参考答案：B

- A、蔬菜瓜果丰富
- B、服用减肥药
- C、三餐搭配合理
- D、食物选择科学

390、肥胖儿进餐时先吃（ ）。……………参考答案：C

- A、肉
- B、汤
- C、蔬菜水果
- D、主食

391、肥胖儿限制进食量先减少（ ）。……………参考答案：B

- A、蛋白质
- B、主食
- C、蔬菜
- D、水果

392、婴幼儿感冒不适宜的食物是（ ）。……………参考答案：D

- A、稀粥
- B、面条
- C、营养汤
- D、油条

393、婴幼儿咳嗽的饮食错误的是（ ）。……………参考答案：B

- A、清淡
- B、喝冷饮
- C、忌辛辣
- D、忌油腻

394、引起婴幼儿腹痛的原因最常见（ ）。……………参考答案：A

- A、消化不良
- B、肠痉挛
- C、胆道蛔虫症
- D、阑尾炎

395、婴幼儿由于细菌感染导致急性腹泻时，其的饮食应以（ ）为宜。……………参考答案：D

- A、米饭
- B、水果
- C、青菜
- D、米汤或粥

396、婴幼儿急性腹泻如有失水可给予（ ）。……………参考答案：D

- A、喝白开水
- B、喝汤汁
- C、喝果汁
- D、口服补液药

397、对于婴幼儿饮食原因导致的急性腹泻，在调整饮食（ ）天左右大便就会正常。……………

参考答案：C

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

398、不会引起婴幼儿便秘发生的原因（ ）。……………参考答案：A

- A、进食凉性食物
- B、乳食积滞
- C、燥热内结
- D、病后体弱

399、4个月大的婴幼儿发生便秘可以添加。……………参考答案：D

- A、牛奶
- B、白开水
- C、米糊
- D、菜泥果泥

400、2岁的婴幼儿发生便秘可多吃（ ）。……………参考答案：D

- A、牛奶
- B、米饭
- C、油炸食品

D、富含纤维素的蔬菜

401、积食婴幼儿需要多吃（ ）食物。……………参考答案：D

A、高脂

B、高蛋白

C、高热量

D、易消化易吸收

402、积食的婴幼儿需要少吃的是（ ）。……………参考答案：A

A、肉

B、蔬菜

C、水果

D、适当的米饭

403、婴幼儿睡醒后（ ）小时内不能进食。……………参考答案：A

A、1

B、2

C、3

D、4

404、吮手指行为在（ ）岁以内婴幼儿多见。……………参考答案：A

A、1

B、2

C、3

D、4

405、不是（ ）婴幼儿屏气发作的表现。……………参考答案：B

A、呼吸暂停

B、心跳正常

C、口唇发紫

D、意识丧失

406、习惯性擦腿是指婴幼儿摩擦（ ）。……………参考答案：C

A、大腿

B、小腿

C、会阴部

D、脚背

407、孤独症起病于（ ）岁前。……………参考答案：C

A、1

B、2

C、3

D、4

408、不属于幼儿期的孤独症表现的是（ ）。……………参考答案：C

A、缺少兴趣和反应

B、呼之不理

C、对陌生人恐惧

D、对抚养者不依恋

409、婴儿期的孤独症表现是（ ）。……………参考答案：A

A、回避目光接触

B、对他人的逗弄感兴趣

C、与人贴近

D、有社交性微笑

410、不属于注意缺陷多动症的注意缺陷表现是（ ）。……………参考答案：A

A、精力集中

B、注意力不能保持长久

C、不能完成任务的实施

D、无法抵御干扰因素

411、不是注意缺陷多动症的多动症状（ ）。……………参考答案：D

A、无法安静的听完一堂课

B、少有片刻安静

C、动手动脚

D、有目的的来回走动、奔跑、跳跃

412、婴幼儿注意缺陷多动症起病大部分在6岁前，其中部分在（ ）岁左右。…参考答案：B

A、2

B、3

C、4

D、5

413、婴幼儿智力发育障碍是指在发育时期内（ ）明显低于同龄儿童正常水平。…参考答案：C

A、身高

B、体重

C、智力

D、头围

414、不是智力发育障碍的病因是（ ）。……………参考答案：D

A、颅内感染

B、新生儿窒息

C、先天脑发育异常

D、新生儿肺炎

415、智力障碍的病因主要为生物学因素，占（ ）。……………参考答案：D

A、0.5

B、0.6

C、0.7

D、0.9

416、关于婴幼儿体操，说法错误的是（ ）。……………参考答案：B

A、根据婴幼儿的生理特点

B、根据婴幼儿的病理特点

C、游戏规则

D、配合优美的音乐

417、不属于婴幼儿体操对婴幼儿动作发展的作用（ ）。……………参考答案：D

A、促进身体正常发育

B、使生理机能水平的提高

C、良好的情绪

D、情感反应慢

418、关于婴幼儿体操对婴幼儿动作发展的作用，说法错误的是（ ）。……………参考答案：C

A、体操能促进身体正常发育和生理机能水平的提高

B、促进抬头、翻身、坐、爬、站等各种基本动作适时的发展

C、贯通骨骼、肌肉、血管与神经的联系

D、能使所要发展的动作更协调、灵活

419、婴幼儿被动操适用于()的婴儿……………参考答案: D

A、2~3个月

B、2~4个月

C、2~5个月

D、2~6个月

420、下列关于婴儿被动操说法错误的是()……………参考答案: A

A、婴儿主动地改变身体姿势的一种操节活动

B、婴儿被动地改变身体姿势的一种操节活动

C、锻炼胸、臂肌肉的发展

D、锻炼肩、膝、股、肘关节及其韧带的功能

421、做婴儿被动操时, 注意事项错误的是()……………参考答案: D

A、动作柔和、轻缓

B、手法要准确

C、可以配轻松、活泼的儿童音乐进行

D、每天4-5次

422、在进行婴幼儿的主被动操弯腰时, 在婴儿前方放一玩具。使婴儿弯腰前倾、拣桌/床上玩具, 拣起玩具后成()。……………参考答案: C

A、弯腰状态

B、后仰状态

C、直立状态

D、前弓状态

423、婴幼儿主被动操适用于()的婴儿。……………参考答案: D

A、7~8个月

B、7~9个月

C、7~10个月

D、7~12个月

424、做婴儿主被动操时的注意事项错误的是()。……………参考答案: A

A、动作轻柔, 不要使婴儿顺势做动作

B、切忌生拉硬拽

C、可以用婴儿平时喜欢的、熟悉的玩具、用品逗引。

D、扶持婴儿时，动作要轻，尽量让婴儿用力，以保证练习的效果

425、婴幼儿模仿操适用于()的婴儿……………**参考答案：D**

A、7~10个月

B、7~12个月

C、12~16个月

D、1.5~3岁

426、练习模仿操划小船时，育婴员和婴幼儿一起做摇晃动作，摇晃动作要()用腰部的力量将身体左右移动。……………**参考答案：B**

A、单手上举

B、双手上举

C、单手划动

D、双手划动

427、练习模仿操跷跷板时，两人双手相拉并伸直，身体稍稍往后仰，然后育婴员起立时婴幼儿()，婴儿起立时育婴员下蹲，交替轮流起立和下蹲，模拟正坐跷跷板。……**参考答案：A**

A、下蹲

B、起立运动

C、平坐

D、翻身

428、婴幼儿玩弄各种东西都运用手指，手指中()最为重要。……………**参考答案：A**

A、拇指

B、食指

C、中指

D、无名指

429、婴幼儿在做手指操时，要让其有脑、眼、手的同时协调，对一些器官的发展有着积极的促进作用，但不包括()。……………**参考答案：D**

A、思维

B、视觉

C、触觉和语言

D、平衡觉

430、关于婴幼儿手指操作用说法错误的是。……………参考答案：C

- A、能锻炼小肌肉的灵活性
- B、小肌肉的协调性
- C、能锻炼大肌肉的灵活性、协调性
- D、开发大脑潜能

431、0~6个月婴幼儿的手指操有()……………参考答案：A

- A、爸爸妈妈瞧一瞧
- B、手指变一变
- C、一二三四五
- D、手指宝宝睡觉了

432、7~12个月婴幼儿的手指操有()……………参考答案：D

- A、手指变一变
- B、手指宝宝睡觉了
- C、爸爸妈妈瞧一瞧
- D、五指歌

433、0~6个月婴幼儿的手指操不应该()，主要以父母或育婴员带动婴儿的手为主……………参考答案：A

- A、复杂
- B、精巧
- C、娴熟
- D、快速

434、游戏手指变一变适宜年龄为()。……………参考答案：D

- A、0-6个月
- B、7~12个月
- C、12-18个月
- D、19-36个月

435、12~18个月婴幼儿的手指操有()。……………参考答案：D

- A、手指宝宝睡觉了
- B、爸爸妈妈瞧一瞧
- C、手指变一变

D、一二三四五

436、13~18个月的婴幼儿能够灵活控制()，利用双手配合完成很多动作。……参考答案：A

A、手指关节

B、脚部关节

C、左手

D、右手

437、婴幼儿手指操可以和()整合起来，促使婴幼儿动作得到全面发展。……参考答案：C

A、被动体操

B、主动体操

C、模仿操

D、婴儿体操

438、关于婴幼儿手指操的注意事项说法正确的是()。……参考答案：A

A、在婴幼儿手指发展的不同阶段，提供不同的手指游戏让婴幼儿进行练习，可以发展良好的感知觉和动作行为

B、在婴幼儿手指发展的相同阶段，提供不同的手指游戏让婴幼儿进行练习，可以发展良好的感知觉和动作行为

C、在婴幼儿手指发展的相同阶段，提供相同的手指游戏让婴幼儿进行练习，可以发展良好的感知觉和动作行为

D、在婴幼儿手指发展的不同阶段，提供相同的手指游戏让婴幼儿进行练习，可以发展良好的感知觉和动作行为

439、婴幼儿的手指操内容要和()相联系。……参考答案：C

A、课件要求

B、考试标准

C、实际生活

D、婴幼儿需要

440、婴幼儿图书是指以()为主体，以图片来讲故事的婴幼儿读物。……参考答案：A

A、图片

B、文字性

C、科学性

D、故事情节

441、下列属于科学性图书的是()。……………参考答案: D

- A、塑造人物形象
- B、营造环境氛围讲故事
- C、短小精悍、朗朗上口的儿歌童谣
- D、将知识巧妙地与故事相整合

442、()是婴幼儿图书阅读的敏感时期,在阅读兴趣、阅读行为、阅读理解上有各种表现特点,并易受其心理发展、成人指导及读物本身的影响。……………参考答案: D

- A、6~12个月
- B、12~18个月
- C、1~2岁
- D、2~3岁

443、大多数的婴幼儿胃食管返流在()时好转。……………参考答案: D

- A、5-6个月
- B、6-7个月
- C、7-8个月
- D、8-10个月

444、目前死亡率已占儿童死亡排位第一位死因的是()。……………参考答案: A

- A、意外伤害
- B、铅中毒
- C、流行疾病
- D、维生素中毒

445、教育理念要渗透到的五个领域是根据()划分。……………参考答案: D

- A、五个系统的学科
- B、婴儿身心发展的特点
- C、成人的经验
- D、婴儿所接触的周围环境和应当获得的生活经验

446、下列不属于综合性个别化教学计划的基本内容的是()。……………参考答案: D

- A、了解婴儿的基本状况
- B、确定教学计划的起点和游戏活动的内容
- C、制定适宜的教学目标

D、实施教学计划的步骤和考评

447、湿疹形态有红肿、脱皮、破损等多种，主要表现为（ ）。……………参考答案：B

- A、疼痛
- B、瘙痒
- C、发烧
- D、呕吐

448、新生儿常见病包括（ ）。……………参考答案：A

- A、脐带发炎、皮肤异常
- B、乙脑、白喉
- C、脑膜炎、结膜炎
- D、湿疹、中风

449、婴幼儿至（ ）岁时，心脏神经装置开始具有成人的特征。……………参考答案：C

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

450、（ ）和语言一样，是婴儿进行人际交流的重要手段。……………参考答案：B

- A、动作
- B、表情
- C、情绪
- D、音乐

451、（ ）属于高级育婴师在早期教育方面比普通育婴员多掌握的内容。……………参考答案：A

- A、能够编制综合性个别化发展计划
- B、进行不同年龄婴儿语言训练
- C、选择适宜的处理训练
- D、进行不同年龄的认知训练

452、婴幼儿头部和脊柱骨折后送医院时搬运方式是（ ）。……………参考答案：D

- A、用背式
- B、抱住坐出租车
- C、两人合作抬头抬脚

D、沙袋固定头部平板车搬运

453、0-2岁婴幼儿智慧发展的顺序为发射活动-尝试错误（ ）。……………参考答案：B

- A、掌握技能
- B、解决简单问题
- C、学习新知识
- D、发展想象

454、人工喂养的婴儿容易发生便秘，主要原因是（ ）。……………参考答案：B

- A、食物过杂
- B、饮水过少
- C、食物温度偏高
- D、食物中蛋白质含量过低

455、（ ）是婴儿发展评价的特点。……………参考答案：B

- A、延续性和局限性
- B、全方位和多方面
- C、因多面性导致操作困难
- D、片面性和局限性

456、（ ）是学习分类与勒戒积木形状大小的首选游戏。……………参考答案：D

- A、1-3岁婴儿投掷积木的游戏
- B、1-3岁婴儿藏积木的游戏
- C、1-3岁婴儿排列积木的游戏
- D、1-3岁婴儿搭垒积木的游戏

457、（ ）的缺乏，会导致婴儿体格和智力发育迟缓，身材矮小。……………参考答案：C

- A、维生素D
- B、叶酸
- C、碘
- D、维生素E

458、以无意记忆为主是在人的（ ）。……………参考答案：C

- A、中年期
- B、青春期
- C、婴儿期

D、老年期

459、人体测量学的各个参数属于（ ）范畴。……………参考答案：C

A、营养结局

B、营养状况

C、生长发育指标

D、健康水平指标

460、关于健康水平指标描述全面的是（ ）。……………参考答案：D

A、生化参数和生活参数

B、生理参数和生活参数

C、营养参数和生理性参数

D、生化参数和生理参数

461、下面哪一组症状反应的是婴儿喂养过度（ ）。……………参考答案：A

A、肚子不舒服、溢奶

B、呕吐、便秘、入睡困难

C、烦躁不安、哭闹、便秘

D、多度增重、虚胖

462、正常情况下，在（ ）个月时，婴儿头围和胸围基本相等。……………参考答案：A

A、6-12

B、12-21

C、24-28

D、30-36

463、容易缺乏又对婴儿发育影响较大的矿物质和微量元素是（ ）等。……………参考答案：B

A、钙、铁、磷、铜

B、钙、铁、锌、碘

C、钾、镁、铜、钴

D、钴、氟、锌、硫

464、中度脱水失水量约为体重的（ ）。……………参考答案：C

A、1-2%

B、2-3%

C、5-10%

D、10-15%

465、()不属于婴儿三浴锻炼的目的。……………**参考答案：A**

- A、提高婴儿自理能力
- B、增强肌肉群的协调性
- C、提高神经系统得灵敏度
- D、增强体温的调节功能

466、如果把父母比作婴幼儿()教师，那么也可以把家庭教养环境比作学校的课堂，把玩具比作教科书。……………**参考答案：C**

- A、善良的
- B、第二任
- C、第一任
- D、尊敬的

467、婴儿在()以后，通过连续翻滚、移动身体的位置等方式，能拿取远距离的玩具或食物，来满足自己的要求。……………**参考答案：B**

- A、4个月
- B、6个月
- C、5个月
- D、3个月

468、0-3岁可以统称为()。……………**参考答案：C**

- A、新生儿期
- B、学龄前期
- C、婴幼儿期
- D、 婴儿期

469、婴幼儿期是学会()、说话，开始独立活动的时期。……………**参考答案：D**

- A、羽毛球
- B、乒乓球
- C、踢足球
- D、走路

470、婴幼儿期的()生长速度是一生中最快的，但生长速度不是直线上升，而是有阶段性的。……………**参考答案：A**

- A、身体
- B、细胞
- C、组织
- D、器官

471、运动系统由骨、关节和骨骼肌组成，约占成人体重的（ ）。……………参考答案：C

- A、0.4
- B、0.5
- C、0.6
- D、0.7

472、骨骼肌附着于（ ），在神经系统支配下收缩和舒张，产生运动。……………参考答案：D

- A、骨膜
- B、肌肉
- C、韧带
- D、骨

473、全身各骨以（ ）相连形成骨骼，起支持体重、保护内脏和维持人体基本形态的作用。……………参考答案：A

- A、关节
- B、软骨
- C、韧带
- D、肌腱

474、婴幼儿脊柱的生理弯曲，一般婴幼儿在（ ）抬头时出现颈曲。……………参考答案：C

- A、4个月
- B、1个月
- C、3个月
- D、2个月

475、婴幼儿脊柱的生理弯曲，（ ）能坐时出现胸曲。……………参考答案：A

- A、6个月
- B、4个月
- C、5个月
- D、3个月

476、婴幼儿脊柱的生理弯曲，()学走时出现腰曲。……………参考答案：D

- A、7~8个月
- B、9~10个月
- C、5~6个月
- D、10~12个月

477、通常把从口腔到十二指肠的这部分管道称为()。……………参考答案：B

- A、下消化道
- B、上消化道
- C、中消化道
- D、消化道

478、大消化腺位于()，如肝和胰。……………参考答案：C

- A、消化管上
- B、消化管内
- C、消化管外
- D、消化管下

479、婴幼儿4-10个月开始出牙，2岁左右长齐，共()。……………参考答案：D

- A、16颗
- B、18颗
- C、15颗
- D、20颗

480、婴幼儿期以腹式呼吸为主，到了()，才逐渐转为胸式呼吸。……………参考答案：B

- A、2岁
- B、3岁
- C、1岁
- D、4岁

481、婴幼儿鼻泪管短，开口接近于内眦部，其瓣膜发育不全，因而鼻腔感染常易侵入结膜囊引起()炎症。……………参考答案：C

- A、耳部
- B、鼻部
- C、眼部

D、口腔

482、婴幼儿黏液腺分泌不足而较干燥，黏膜纤毛运动差，不能很好地清除（ ）及黏液，易发生感染。……………参考答案：D

A、细菌

B、病毒

C、衣原体

D、微生物

483、婴幼儿上呼吸道具有调节（ ）的作用。……………参考答案：A

A、温度

B、湿度

C、体温

D、呼吸

484、婴幼儿鼻腔无鼻毛，灰尘、（ ）等易侵入呼吸道。……………参考答案：B

A、支原体

B、微生物

C、细菌

D、病毒

485、婴幼儿肺回缩力与胸廓回缩力较成人（ ），故肺处于膨胀状态。……………参考答案：C

A、强

B、弱

C、小

D、大

486、新生儿肾脏相对较（ ），肾表面凹凸不平。……………参考答案：B

A、小

B、大

C、轻

D、重

487、新生儿肾脏呈分叶状，位置较低，故（ ）以下婴幼儿肾脏容易扪及。……………参考答案：C

A、4岁

B、3岁

C、2岁

D、5岁半

488、新生女婴尿道仅长（ ），外口暴露且接近肛门，易受粪便污染。……………**参考答案：D**

A、3cm

B、2.5cm

C、2cm

D、1cm

489、内分泌系统是（ ）以外的一个重要的调节系统。……………**参考答案：B**

A、生殖系统

B、神经系统

C、呼吸系统

D、消化系统

490、激素是（ ）借以调节机体生理代谢活动的化学信使。……………**参考答案：C**

A、神经系统

B、免疫系统

C、内分泌系统

D、循环系统

491、激素是内分泌系统借以调节（ ）的化学信使。……………**参考答案：B**

A、睡眠

B、机体生理代谢活动

C、食欲

D、皮肤感觉

492、新生儿心脏重（ ），占体重的0.8%。……………**参考答案：B**

A、15~20g

B、20~25g

C、10~15g

D、30~40g

493、新生儿心脏1~2岁重达60g，较新生儿时期增加两倍多，占体重的（ ）。……………

参考答案：C

A、0.006

B、0.007

C、0.005

D、0.009

494、出生后第一年心脏增长最快，() 及青春期增长速度再次加快。……………参考答案：D

A、5~6岁

B、6~7岁

C、7~8岁

D、7~9岁

495、新生儿呼吸每分钟平均()，脉搏与呼吸比为3:1. ……………参考答案：B

A、30-40次/分

B、40-50次/分

C、20-30次/分

D、50-60次/分

496、婴儿鼻根()，鼻腔相对较短。……………参考答案：A

A、扁而宽

B、扁而窄

C、高而宽

D、低而宽

497、1-3岁婴幼儿呼吸每分钟平均()，脉搏与呼吸比为3-4:1. ……………参考答案：D

A、20-30次/分

B、30-40次/分

C、35-40次/分

D、25-30次/分

498、婴幼儿皮肤细嫩，角质层()。……………参考答案：C

A、肥

B、厚

C、薄

D、深

499、婴幼儿皮肤新陈代谢()，分泌物多，需要经常清洗。……………参考答案：B

A、慢

- B、快
- C、差
- D、较慢

500、婴幼儿皮肤渗透作用强，一些有害物质很容易通过皮肤被机体（ ），引起中毒。……………参考答案：D

- A、代谢
- B、排泄
- C、释放
- D、吸收

二、多选题

1、职业道德是依靠（ ）来维持的行为规范的总和。（A,D,E）

- A、社会舆论
- B、法律
- C、法规
- D、传统习惯
- E、内心信念

2、婴幼儿教育的原则包括（ ）。（A,B,C,D）

- A、尊重婴幼儿发展权利
- B、促进婴幼儿全面和谐发展
- C、以情感体验为主体
- D、保教并重
- E、不需关注个别差异

3、婴幼儿家庭教养环境可分成（ ）。（A,B,C,E）

- A、生活类
- B、运动类
- C、游戏类
- D、情感满足类
- E、学习类

4、触电现场急救：对呼吸心跳已停止的触电者，应立刻做（ ）。（A,B,C,D）

- A、口对口吹气

B、胸外心脏挤压

C、抢救不可中断

D、注意保护灼伤的创面

E、不需要用干净纱布或被单等覆盖创面

5、婴幼儿喂药的原则有（ ）。 （C,D）

A、大约药量

B、婴幼儿不吃，可采用恐吓、威胁等手段

C、严格按照医嘱给药

D、认真阅读说明书

E、可以喂大人的药

6、（ ）等是婴儿观察判断事物的途径。 （A,B,C,D,E）

A、嗅觉

B、触觉

C、味觉

D、听觉

E、视觉

7、婴幼儿脊柱发育特点有（ ）。 （A,B,C,E）

A、出生第一年增长快于四肢

B、出生第一年后增长慢于四肢

C、新生儿时轻微后凸

D、4个月出现颈椎前凸

E、6个月后出现胸椎后凸

8、婴幼儿体格生长过程中，体重增长偏离会受到（ ）影响。 （A,B,C,D）

A、营养

B、疾病

C、遗传

D、内分泌

E、其他人

9、婴幼儿测量身高的注意事项有（ ）。 （B,D,E）

A、推动滑板是要重一点

B、推动滑板是要轻快

C、婴幼儿取俯卧位

D、婴幼儿取仰卧位

E、头枕部、肩胛部、臀及双足根要贴紧测量板

10、婴幼儿头围测量的用物准备包括（ ）。 （A,B,C,E）

A、软尺

B、逗引玩具

C、婴幼儿模型

D、婴儿外套

E、记录本

11、后囟门由（ ）构成。 （A,B）

A、枕骨

B、顶骨骨缝

C、额骨

D、面骨

E、颞骨

12、婴幼儿生长发育的一般规律性是（ ）。 （A,B,D,E）

A、头尾规律

B、由近到远

C、由细到粗

D、由简单到高级

E、由低级到高级

13、婴幼儿动作的发展规律是（ ）。 （A,C,E）

A、有上而下

B、由下而上

C、有近及远

D、由远及近

E、有不协调到协调

14、感觉是反映当前客观事物个别属性的认识过程，例如物体的（ ）等。 （A,B,C,D,E）

A、声

B、色

C、冷

D、热

E、软

15、新生儿主要靠感官（ ）认识周围世界，3岁时不仅有了相当的观察、记忆、思维能力，而且情绪和情感也大大丰富了。 （A,B,C,D）

A、眼

B、耳

C、口

D、手

E、温度觉

16、0-3岁婴幼儿常见的发育行为问题有（ ）。 （A,B,C,D,E）

A、吮手指

B、屏气发作

C、交叉擦腿动作

D、暴怒发作

E、攻击性行为

17、心理学上把气质划分为（ ）。 （A,C,D,E）

A、多血质

B、少血质

C、胆汁质

D、黏液质

E、抑郁质

18、婴幼儿的能量消耗主要用于以下几部分（ ）。 （B,C,D,E）

A、睡眠、休息

B、体力活动

C、生长发育

D、食物特殊动力作用

E、排泄

19、母乳中含有（ ），有助于预防呼吸道及胃肠道的感染 （A,B,C,D,E）

A、微量元素

B、水

C、分泌型免疫球蛋白

D、乳糖

E、丰富的抗体

20、百日咳家庭护理包括（ ）。 （A,B,C,D,E）

A、提醒家长及时接种百日咳疫苗

B、保持室内空气流通

C、流行期间减少公共场所活动，避免传染

D、加强婴幼儿营养

E、注意锻炼身体，提高抵抗疾病的能力

21、腹痛的原因有（ ）。 （A,B,C,D）

A、胃肠道痉挛

B、肠虫症

C、急性阑尾炎

D、肠套叠

E、肠蠕动

22、由于婴幼儿（ ），很容易感染轮状病毒。 （A,C,E）

A、胃肠功能较弱

B、胃肠功能较强

C、胃液和消化液相对较少

D、胃液及消化液相对较多

E、胃肠道的抵抗力差

23、水痘预防和护理方法有（ ）。 （A,B,C,D）

A、保持皮肤清洁健康

B、引导婴幼儿不要用手抓

C、勤换衣服

D、剪短指甲

E、多捂汗

24、循环系统是由 ()组成。 (A,B)

A、心脏

B、血管

C、肺

D、气管

E、支气管

25、泌尿系统包括 ()。 (A,B,C,D)

A、肾脏

B、输尿管

C、膀胱

D、尿道

E、肾盂

26、婴幼儿肾脏解剖及生理特点有 ()。 (A,C,E)

A、位置较低

B、出生时还不能发挥作用

C、储备功能差

D、调节机制已成熟

E、调节机制不够成熟

27、感觉系统包括 ()。 (A,B,C,E)

A、视觉

B、听觉

C、触觉

D、感觉

E、嗅觉

28、神经系统包括 ()。 (A,B)

A、中枢神经系统

B、周围神经系统

C、循环系统

D、生殖系统

E、内分泌系统

29、婴幼儿的大脑发育及功能特点有（ ）。 （A,D,E）

A、小脑发育晚

B、小脑发育早

C、平衡能力好

D、平衡能力差

E、动作协调性差

30、运动系统是由（ ）组成。 （A,B,C）

A、骨

B、关节

C、骨骼肌

D、神经

E、血管

31、婴幼儿的肌肉发育的顺序（ ）。 （A,B,C,D）

A、从上到下

B、从大到小

C、先发育颈部肌肉

D、先发育大肌群

E、先发育小肌群

32、生殖系统是由（ ）组成。 （A,D）

A、内生殖器

B、心脑血管

C、骨骼

D、外生殖器

E、感受器

33、人体主要的内分泌腺包括（ ）。 （A,B,D,E）

A、甲状腺

B、甲状旁腺

C、肾脏

D、肾上腺

E、垂体

34、婴幼儿乳牙的特点 ()。 (B,C,E)

A、牙釉质厚

B、牙本质松脆

C、易形成龋齿

D、龋齿不会疼痛

E、一旦出现龋齿，发展较快

35、婴幼儿骨骼的特点 ()。 (A,B,D,E)

A、柔软

B、弹性大

C、骨与骨之间缝隙窄

D、可塑性强

E、含胶原蛋白多

36、婴幼儿口腔的特点 ()。 (A,C,D)

A、口腔浅

B、牙槽突发育较好

C、硬腭穹隆较平

D、舌短宽而厚

E、唇肌和咬肌发育较差

37、消化道包括 () 大小肠等。 (A,B,D,E)

A、口腔

B、咽

C、气管

D、食道

E、胃

38、婴幼儿气管和支气管的特点。 (A,B,C,D)

A、相对狭窄

B、黏膜柔嫩

C、黏膜血管丰富

D、支持作用差

E、气道湿润

39、循环系统包括 ()。 (B,E)

A、呼吸系统

B、血管系统

C、消化系统

D、神经系统

E、淋巴系统

40、新生儿生后 2-3 天的尿液特点 ()。 (B,C,D)

A、尿液色较浅

B、尿液色较深

C、稍浑浊

D、尿液会将尿布染成淡红色

E、尿液会将尿布染成深红色

41、新生儿的出生体重与 () 有关 (A,B,C,D)

A、胎次

B、胎龄

C、性别

D、宫内的营养状况

E、出生后的营养状况

42、婴幼儿营养不良的症状有 ()。 (A,B,C,D)

A、面色、睑结膜苍白

B、皮下脂肪少

C、肌肉松弛

D、头发干枯

E、智力发育正常

43、影响婴幼儿体温的因素 ()。 (A,B,C,D)

A、进食

B、哭闹

C、运动

D、穿衣薄厚

E、看图画

44、发热的热型可分为（ ）。 （C,D,E）

A、高热

B、低热

C、稽留热

D、弛张热

E、间歇热

45、通过高级育婴员指导家长，可以（ ）。 （A,B,E）

A、推动育婴理论向实践化

B、积累更多的育婴经验

C、激发育婴员反思自身的教育方式

D、提升育婴员的职业水平

E、激发家长反思自身的教育方式

46、在婴幼儿早期，家庭对婴幼儿的发展具有重要的影响，现有的研究发现，（ ） 等都会影响婴幼儿的发展。 （A,B,C,D,E）

A、亲子关系

B、家庭教养方式

C、夫妻关系

D、家庭类型

E、子女数目

47、高级育婴员指导的原则为（ ）。 （A,B,C,D）

A、科学性原则

B、针对性原则

C、有效性原则

D、便利性原则

E、时效性原则

48、根据家长或育婴员的不同情况和需要，指导形式的分类各有不同，一般包括（ ）等几种。
（A,B,C,D,E）

A、咨询

B、操作示范

C、讲解或讲座

D、活动

E、宣传资料发布

49、主干家庭对家庭教养的不利因素有（ ）。 （A,B,C,D）

A、思想观念陈旧

B、容易忽略孩子成长的需求

C、增加祖辈负担和压力

D、容易对孩子形成溺爱

E、思想观念超前

50、“溺爱型”家长成了孩子的奴仆，造成孩子的身心发展极不健康，往往表现出（ ），严重者则有动作、语言等发展迟缓的症状。 （A,B,C,D）

A、任性

B、骄横

C、自私

D、独立性差

E、独立性强

三、判断题

1、重度脱水因水容量极度减少而出现休克症状，表现为心音低钝、脉细速、血压下降、四肢厥冷、尿量极少或无尿。 （√）

2、孕早期脂肪贮存量的多少新生儿出生体重的高低起着巨大的作用。 （×）

3、婴儿发展评价的方法不包括指标评价法。 （√）

4、婴幼儿每日供给的蛋白质为 150g。 （×）

5、目前意外死亡已占我国 0-14 岁儿童死亡排位的第一死因。 （√）

6、婴儿翻身动作训练的游戏有滚西瓜。 （√）

7、新生儿没有想象力。 （√）

8、婴幼儿 3 岁左右，在活动过程中，通过自我感觉逐步认识作为生物实体的自我。 （×）

9、亲手为宝宝制作食品，安全性较有保障，而且价格便宜，经济又实惠。 （√）

10、看食品的色泽，应该购买外观鲜艳、好看的食物。 （×）

11、未成年人接受的赠款、礼物归属未成年人所有。未成年人的父母或其他监护人可以将该款、物据为己有。 （×）

- 12、咖啡因能使胃肠壁上的毛细血管收缩，儿童的骨骼发育也会因此受到影响。（√）
- 13、抬头、立、坐、行、跑、跳等是婴儿大动作发育的顺序。（×）
- 14、一般情况下，婴儿4个月可以识别人与物。（×）
- 15、婴儿自我意识发展一般经历6个阶段。（×）
- 16、一般来说，正常人人体通过听觉从外界获取信息最多。（×）
- 17、大动作训练要做到时间短、次数多。（√）
- 18、月龄为1月的婴儿24小时平均喂养次数为7--8次。（√）
- 19、年龄越小，生长速度越慢是婴儿生长速度和年龄段的关系。（×）
- 20、我国将儿童期的发展过程分为新生儿期，婴儿期，学前期，学龄期，少年期和青年期六个阶段。（×）
- 21、喉咽软骨发育不完善是婴幼儿容易发气官异物的原因。（√）
- 22、0-1岁是智力发展的奠基时期。（×）
- 23、处理意外伤害的家庭小药箱里要备有：止咳药、消化药、感冒药、退热药等。（×）
- 24、制定综合性个别化教学计划，首先要了解婴儿的基本状况。（√）
- 25、设计游戏活动时要遵循活动性、游戏性、差异性、环境育人等基本原则。（√）
- 26、在临近或略高于婴儿的发展水平的位置确定各个领域的游戏目标。（√）
- 27、长期目标是婴儿发展的阶段性目标。（×）
- 28、婴幼儿高热时可以用75%的酒精进行擦浴。（×）
- 29、为了预防佝偻病，婴儿从2~3个月就要开始补充维生素D。（×）
- 30、婴儿一般发展水平是指相同年龄阶段的婴儿在个别领域中的特征性行为表现。（×）
- 31、1-3岁为言语的初步发展期。（√）
- 32、1g蛋白质提供热能4cal。（√）
- 33、婴儿常见疾病有侏儒症，心血管病，水痘，湿疹、呕吐，腮腺炎。（×）
- 34、指导培训家长和看护人应采用书信或是网上论坛等方法。（×）
- 35、教学、实践和社会是育婴员进行评估的有效渠道。（√）
- 36、培训人员要持证上岗，培训指导的内容就必须要有系统的理论知识，又要体现实现操作能力。（√）
- 37、差异性原则要求培训内容从简到繁，从低到高，与培训象的基础和接受能力相适应。（×）
- 38、目前从事育婴职业的人员存在基础和文化水平不同的状况。（√）
- 39、婴儿出生6个月从母体获得的抗体逐渐增多。（×）

- 40、1-3 岁的婴儿每天粮食的摄入量参考量为 125 克。 (√)
- 41、在给婴儿进行接种疫苗时，必须全面观察婴儿身体的健康状况。 (√)
- 42、职前培训、在职培训和转岗培训是职业培训的主要分类。 (√)
- 43、空间想象是 3 岁前婴儿想象的特点。 (×)
- 44、年龄越小心律及血流速度越慢。 (×)
- 45、婴儿的活动是多种多样的，所以教育教学活动也要体现出多样性。 (√)
- 46、依据行程性评估的结果，及时调整和修正教学计划和游戏方案。 (√)
- 47、婴儿睡前不宜过度兴奋。 (√)
- 48、天气的变化婴儿饮水量无影响。 (×)
- 49、儿童造成单纯性肥胖症的病因是过度疲劳。 (×)
- 50、0-6 岁可以统称为婴儿期。 (×)
- 51、0-3 岁是梁何国儿童基金会儿童期的界定范围。 (×)
- 52、盖泽尔发育量表适用于出生后 4 周到 3.5 岁的婴幼儿。 (√)
- 53、表扬是执行教学计划或游戏方案时，常用的技巧和方式。 (√)
- 54、生活类区域在家庭内的区域不应固定。 (×)
- 55、盥洗属于婴幼儿常见生活类区域。 (√)
- 56、气管属于上呼吸道。 (×)
- 57、0-6 个月体重 (kg) = 出生体重 + 月龄 * 0.9。 (×)
- 58、0-6 个月体重 (kg) = 出生体重 + 月龄 * 0.7。 (√)
- 59、2-12 岁儿童身高 = 年龄 * 7 + 70 (cm)。 (√)
- 60、矮身材是身高低于同年龄、同性别正常婴幼儿的中位数减 5 个标准差。 (×)
- 61、婴幼儿胸围测量的环境湿度一般在 55%-65%。 (√)
- 62、婴幼儿头围测量的读数一般至 1cm。 (×)
- 63、婴幼儿囟门越早闭合越好。 (×)
- 64、囟门早于 6 个月或超过 18 个月未闭合均为异常。 (√)
- 65、婴幼儿期的身体生长速度是一生中最慢的。 (×)
- 66、感觉能力和知觉能力是两种不同的能力，但又密切相关。 (√)
- 67、知觉是反映当前客观事物整体特性的认识过程，它是在知觉的基础上形成的。 (×)
- 68、发展的连续性是指婴幼儿心理发展是一个不可中断的过程，而且这一过程有其自身的逻辑发展顺序。 (√)

- 69、婴幼儿时期是心理发展和生长发育最快的时期，生理、智力、情绪和社会行为各方面的发展互相影响。（√）
- 70、体重是判断佝偻病的主要依据。（×）
- 71、婴儿常见病湿疹多在六个月左右发生。（√）
- 72、为提高婴儿免疫水平，免受疾病传染，必须按照严格的接种程序进行预防接种。（√）
- 73、生长速率快是宫内生长发育的正确规律。（√）
- 74、每天应为婴儿选择 10 种以上的食物。（√）
- 75、只吃素食是合理的营养要求。（×）
- 76、儿童手部精细动作发育完成时间为 2 岁左右。（×）
- 77、吸吮和吞咽反射是新生儿出生时已具有的。（√）
- 78、12 个月的婴儿，钙的参考摄入量为 600mg。（√）
- 79、育婴员不必具备处理意外伤害的应急救护知识。（×）
- 80、切断病原体传给健康人，需要各种排泄物及时进行消毒。（√）
- 81、高级育婴员的工作任务就是婴幼儿家庭教育指导工作。（×）
- 82、咬指甲可引起甲沟炎、甲刺、皮肤感染。（√）
- 83、婴幼儿暴怒发作时应严厉管教，以硬硬，不会发生安全问题。（×）
- 84、1 岁以下是水痘的高发期。（×）
- 85、婴幼儿语言的发展只要随意进行观察记录即可。（×）
- 86、“要充分重视婴幼儿的反应”是感知能力发展的观察评估原则之一。（√）
- 87、婴幼儿教学地点只要有讲课教室就可以。（×）
- 88、病毒性上呼吸道感染，高热必须用抗菌素。（×）
- 89、脂肪是人体重要的能量来源，且生产能量高。（√）
- 90、家长指导的形式应改变单一性，提倡多样性。（√）
- 91、餐具的消毒采用阳光暴晒的方法。（×）
- 92、婴幼儿控制大小便的能力取决于听力和脑神经反射。（√）
- 93、婴幼儿意外高楼跌下，抢救生命的时候，呼吸、心跳抢救应分进行。（×）
- 94、3 岁前婴幼儿已具有了美感、理智感和道德感的萌芽。（√）
- 95、蔬菜用油炒后的能量密度就不炒的蔬菜高。（√）
- 96、婴幼儿腹泻中病毒感染多见于大肠杆菌、痢疾杆菌，夏季发病较多。（×）
- 97、焦虑在婴幼儿阶段的常见表现主要是分离焦虑。（√）

- 98、集中培训是进行带教与培训的模式之一。（√）
- 99、专题讲座是进行带教与培训的模式之一。（√）
- 100、个别指导是进行带教与培训的模式之一。（√）
- 101、现场指导是进行带教与培训的模式之一。（√）
- 102、学习交流是进行带教与培训的模式之一。（√）
- 103、动脉因血管细微，出血后容易凝固而能自行止血。（×）
- 104、腹泻十分凶险，治愈率低，一旦发病死亡率极高。（×）
- 105、大脑是婴幼儿接受教育的物质基础，也为婴幼儿心理的迅速发展提供了生理基础。（√）
- 106、家庭药箱中的药物分为外用药和内服药。（√）
- 107、异物进入婴幼儿食道，不能自行给婴幼儿服用泻药，这是避免肠道停止蠕动。（×）
- 108、婴幼儿的免疫功能较差，患腹泻时很容易发生穿孔。（×）
- 109、给婴儿换尿布或衣服时，成人不能离开，可用一只手护住婴儿。（√）
- 110、婴儿发生跌伤时不会引起颅内出血。（×）
- 111、蜂毒过敏的婴幼儿被蜂蜇后，不会发生吞咽困难、声门水肿闷气等症状。（×）
- 112、婴幼儿发生烫伤表面涂酱油、黄酒。（×）
- 113、流鼻血期间应食用一些温凉、富含蛋白、维生素及铁剂的食物。（√）
- 114、流鼻血时用冷水或冰水漱口，使血管收缩，减少出血。（√）
- 115、巨大儿是指出生体重超过 4000 克者。（√）
- 116、新生儿假月经是由于妊娠后期性激素进入胎儿体内，出生后突然中断所致。（×）
- 117、亚健康是指人处于健康和疾病之间的一种状态。（√）
- 118、鹅口疮是由白色念珠菌感染引起。（√）
- 119、婴幼儿出生后应尽早进行户外活动，呼吸新鲜空气。（√）
- 120、腹部抚触是从上腹部轻轻施压按摩至下腹部，平移手指到左下腹时呈倒“U”字形。（√）
- 121、背部抚触，将一手掌放在婴儿的臀部正上方的骶尾凹陷，逆时针方向按摩。（×）
- 122、可使用使用饮料灌装杀虫剂、洗涤剂、洗涤剂、洗涤剂、洗涤剂等洗剂用品。（×）
- 123、为了扩大婴幼儿视野，乘坐公交车时，婴幼儿的头、手可伸出窗口。（×）
- 124、心肺复苏急救原则：心、肺复苏应同步进行。现场抢救成功后，应迅速妥善将患儿转送医院继续抢救。（√）
- 125、如尚有心跳的患儿进行心脏按压，不会导致心搏停止。（×）
- 126、2 岁以下的婴幼儿心肺复苏，应采用口口的方法进行人工呼吸。（×）

- 127、心肺复苏开放气管通道采用仰头抬颏法，使头后仰 20°。（×）
- 128、婴幼儿哭泣时，为哄其开心，喂食小颗粒状食物。（×）
- 129、婴幼儿可以喂食果冻状食物，软易消化。（×）
- 130、拍打法一般拍击 4-5 次，异物可被咳出。（√）
- 131、使用拍背法和推腹法使气管异物排出，应迅速清除口腔内的阻塞物。（√）
- 132、只有疯狗才带狂犬病毒。（×）
- 133、被狗咬伤处理完伤口，应立即送医治疗，预防狂犬病。（√）
- 134、触电婴幼儿脱离电源后，如心跳呼吸停止应立即实施心脏按压和人工呼吸。（√）
- 135、关节脱臼时骨骼组织不熟悉不能随意复位，先固定再送医院治疗。（√）
- 136、关节脱臼可采取局部热敷，减轻疼痛。（×）
- 137、按摩取穴和手法不当，不但达不到催乳效果，还可能伤害到产妇。（√）
- 138、药物催乳最常见的是王不留行和通草。（√）
- 139、手太阴肺经的主要催乳穴有云门和中府。（√）
- 140、手少阴心经主要催乳穴为极泉。（√）
- 141、按摩催乳拿法有二指拿三指两种手法。（×）
- 142、点法是由按法演变而来，适用于全身各部位及穴位。（√）
- 143、按揉膻中，产妇取仰卧式或坐位，双指按揉、摩 1 分钟。（√）
- 144、按摩前催乳师两手需搓热，产妇乳房上涂动物油。（×）
- 145、乳汁淤积按摩手法首先按压神庭、百会、风池。（√）
- 146、按摩乳房时以乳母不痛为原则。（√）
- 147、穿山甲孕妇禁服。（√）
- 148、紫河车俗称胎盘。（√）
- 149、花生适宜产后体虚乳汁不足者。（√）
- 150、花生炖猪蹄阳虚少乳者有效。（×）
- 151、营养不良通常是由挑食、偏食、零食吃得多造成的。（√）
- 152、一岁时尚未断奶，不添加辅食易致营养不良性贫血。（√）
- 153、肥胖儿可以服用减肥食品和药品帮助减肥。（×）
- 154、肥胖儿吃的食物应以凉拌清蒸水煮清炖为主。（√）
- 155、婴幼儿感冒期间需要增加喂奶次数，保证营养。（×）
- 156、婴幼儿消化不良可引起腹痛。（√）

- 157、婴幼儿如果是牛奶过敏性腹泻，可断牛奶，改喝羊奶和马奶。（×）
- 158、便秘是指大便干硬难解或隔2~3天甚至更长时间才排便一次。（√）
- 159、如果婴儿存在顽固性的便秘，需要就医检查排除疾病。（√）
- 160、婴幼儿晚上可以吃多吃饱，满足身体发育的需要。（×）
- 161、婴幼儿一日三餐要定时定量，不能饥一顿饱一顿。（√）
- 162、夏季食谱要考虑的季节因素是气温高、出汗多，以清淡为主。（√）
- 163、学会治疗婴儿的疑难杂症是育婴员的职责。（×）
- 164、掌握婴儿常见疾病的防治是常见疾病护理的学习目标。（√）
- 165、学习家庭护理方法是育婴员需掌握的知识。（√）
- 166、0-3岁育婴职业标准化、规范化管理的依据是《教师国家职业标准》。（×）
- 167、0-3岁育婴职业标准化、规范化管理的依据是《育婴员国家职业标准》。（√）
- 168、长期目标是婴儿个别化教学目标之一。（√）
- 169、短期目标是婴儿个别化教学目标之一。（√）
- 170、婴儿第一个重要的生长发育阶段是宫内生长发育。（√）
- 171、婴幼儿抽风时，不可进食，进水，以免发生呕吐引起窒息。（√）
- 172、婴幼儿18个月以后出牙称为出牙延迟。（×）
- 173、婴儿两侧颊部的脂肪垫发达，有助于吸吮乳汁。（√）
- 174、闻诊包括听声音、嗅气味两个方面。（√）
- 175、在四诊中，以问诊为主，望、闻、复诊为辅。（×）
- 176、脾阴不足体质多见于早产儿和贫血患儿。（×）
- 177、痰湿体质易患感冒咳嗽，易发展为肥胖症。（√）
- 178、揉法根据着力部位的不同，分为指揉法、鱼际揉法、掌根揉法3种。（√）
- 179、掐法适用于胸腹部和手足部。（×）
- 180、小儿推拿大多数穴位分布在头面部、四肢，尤其是双手分布最多。（√）
- 181、天庭穴有活血、化瘀、消肿功效。（×）
- 182、鸡蛋清用于风寒感冒、胃寒等推拿治疗。（×）
- 183、白酒用于麻木不仁，局部淤血等推拿治疗。（√）
- 184、感冒又称伤风，是婴幼儿感受触冒风邪而引起的一种内感性疾病。（×）
- 185、风寒感冒治疗的原则是清热解表。（×）
- 186、脾虚泻治疗原则是健脾益气，温阳止泻。（√）

- 187、伤食泻治疗原则是消食导滞，和中健脾。（√）
- 188、惊厥患儿经推拿后症状未减轻者，应保持其侧卧位，防止窒息。（√）
- 189、掐、拿、捏等较强刺激手法，一般放在前面操作。（×）
- 190、皮肤患处及皮肤有破损者，禁止推拿。（√）
- 191、气质是人心理活动的稳定的动力特征，气质是稳定的，不可变的。（×）
- 192、婴幼儿的分离焦虑的出现与其气质有关。（×）
- 193、分离焦虑是婴幼儿离开妈妈时出现的一种焦虑、不安的情绪体验。（√）
- 194、夜惊是指睡眠时发生的一种突然惊恐的反应。（√）
- 195、大多数夜惊不会自行消失，需特殊处理。（×）
- 196、言语发育迟缓可分为接受性言语障碍和表达性言语障碍。（√）
- 197、表达性言语障碍的儿童，需要经过特殊的训练才可获得语言能力。（×）
- 198、发展性语音不清的儿童存在发音器官或神经系统的器质性病变。（×）
- 199、婴幼儿在学习语言时，与发音不清的人交往和学习，易导致婴幼儿发展性语音不清。（√）
- 200、口吃是生理上的缺陷或发音器官的疾病。（×）
- 201、口吃常在某个字或单词上出现停顿、重复、拖音等现象。（√）
- 202、观察的方法可以是目睹、照片或摄像等。（√）
- 203、观察的方法可以只有有计划观察一种。（×）
- 204、0-1个月的婴儿能较自如地转动身体。（×）
- 205、4-6个月的婴儿会扯纸张。（√）
- 206、育婴员工作质量的优劣、工作水平的高低，直接关系到0~3岁婴幼儿的身心健康。（√）
- 207、育婴员是在家庭、社区和早期教育机构中为0~3岁婴幼儿全面发展提供全方位服务和指导的专业人员，但不承担社会责任。（×）
- 208、育婴员是适应我国社会发展需要而产生的一种新职业。（√）
- 209、育婴员职业技能的规范性，体现在育婴实践过程中的规范操作要求和职业道德的规范性。（√）
- 210、育婴员是社会经济发展中出现的单纯型职业，需要育婴员0~3岁婴幼儿做好照料工作。（×）
- 211、掌握社会主义道德和职业道德的基本知识，从业人员增强在职业活动中的竞争能力也具有重要意义。（√）
- 212、育婴员的职业守则就是育婴员职业习惯的具体体现和指导。（×）

- 213、热爱工作是由育婴员的职业象决定的。（×）
- 214、育婴员只有工作融入了情感，倾注了心血，才能为婴幼儿及其家长认同和接受。（√）
- 215、无论在任何时候，育婴员都要尊重自己的岗位职责。（√）
- 216、为职业全心尽责，强调的是把0~3岁婴幼儿的利益放在第二位（×）
- 217、婴幼儿及其家庭的有关资料保密，保护个人隐私。（√）
- 218、育婴员需要学习和婴幼儿沟通。（√）
- 219、育婴员不需要学习和婴幼儿家庭中其他成员沟通（×）
- 220、勤奋好学是育婴员参加职业培训的基本态度。（√）
- 221、钻研业务是育婴员掌握技能的次要方法。（×）
- 222、为了预防婴幼儿烫伤，育婴员应将热的食物或者开水放放在婴儿够不到的地方，怀抱婴幼儿时不要端热饮料或较热的食品。（√）
- 223、新生儿心率每分钟约100-120次。（×）
- 224、新生儿马牙是正常上皮细胞堆积或黏膜分泌物积聚所致。（√）
- 225、亚健康主要分躯体亚健康、心理亚健康和精神亚健康。（×）
- 226、新生儿“板牙”，属异常现象。（×）
- 227、婴幼儿进行户外活动时间应由开始的每次5-15分钟，逐渐延长为1-2小时。（√）
- 228、均衡膳食可以发挥各种失误的营养效能。（√）
- 229、儿童的每个年龄段都具有不稳定不独立的特点。（×）
- 230、婴儿骨骼容易弯曲、变形的原因是骨骼含骨胶原蛋白等有机物少。（×）
- 231、婴儿食物烹调方法以炸为主。（×）
- 232、菠菜与鸡蛋同吃可以促进钙吸收。（×）
- 233、游戏活动是促进婴儿各领域发展的重要形式，也是实施教育教学的重要手段。（√）
- 234、婴儿的活动是多种多样的，其中最基本的活动是游戏。（√）
- 235、轻度脱水眼窝和前卤无凹陷。（×）
- 236、哮喘是一种慢性呼吸道疾病，极易反复发作，多数患儿有过敏史及家族史。（√）
- 237、婴幼儿手部精细动作到3岁左右才能发育完成。（×）
- 238、不要带婴儿去街边玩耍或长期停留，避免摔伤和避免婴儿找不到回家的路。（√）
- 239、如果没有注射疫苗，会使免疫力降低，无法产生抵抗力，出现“免疫麻痹”。（×）
- 240、婴儿服装最好选择鲜艳、美观的棉织品。（×）
- 241、培训计划的主要内容有时间、地点、内容、目标、评估、结业、组织管理、总结。（√）

- 242、哮喘不会因某些诱发因素而反复发作。（×）
- 243、10岁前的儿童由于眼睛发育不完善，眼球前后径短，物像往往落在视网膜后面，容易造成儿童的生理性远视。（×）
- 244、婴幼儿由于远视，看近物时需要放松睫状体使晶状体突出。（√）
- 245、长时间看近物，容易造成睫状体疲劳，眼睛调节能力下降。（√）
- 246、根据婴儿的不同活动内容和兴趣妥善配置食物。（×）
- 247、不应该围绕育婴师的生活经验和家庭需要来选择游戏素材。（√）
- 248、婴儿教育的起点决定教学及游戏活动的内容和方法。（√）
- 249、掌握婴儿个别特点是为了婴儿施特殊教育。（×）
- 250、宝宝带上一个“听诊器”，装扮成大夫给“病人”看病，是宝宝思维能力活跃的表现。（×）